

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и ~~и~~ ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
изъ творческаго *издаваемыя*

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

Fumum de patriis . . . videre focus ,

Nescio , qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКА.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1817.

Печатанъ позволяетъ, съ представле-
ніемъ 5 экземпляровъ въ Цензурный Ко-
митетъ для казенныхъ мѣстъ. Москва,
Сентября 22 дня, 1816. О. П. Надвор-
ный Советникъ и Кавалеръ Левъ Цвѣтасевъ.

Россійская Имперія такъ обширна, что въ различныхъ мѣстахъ оной водится животныя не только общія ей съ другими странами свѣта, но и такія, кооторыхъ до сихъ поръ нигдѣ въ другихъ мѣстахъ не примѣчено. Въ издаваемыхъ мною описаніяхъ будущь помѣщаемы животныя и рѣдкія, въ нѣкооторыхъ только странахъ Россіи живущія, и такія, кооторыя распространились по всей Россіи, и слѣдовательно находятся и въ другихъ частяхъ свѣта. Въ каждой книжкѣ будетъ помѣщено по два или по одному животному изъ отдѣленія животныхъ млекопитающихъ, по одной птицѣ и по одной рыбѣ; насколько и другія животныя будутъ помѣщаемы рѣже. Если сей первый опытъ понравится Публикѣ, то въ послѣдствіи времени боль-

И

шее число будесть выходить животныхъ млекопитающиихъ и птицъ, а попомъ уже рыбъ и другихъ животныхъ, чтобы такимъ образомъ составилась полная Исторія хопя одного отдѣленія животныхъ Россійскихъ. Поелику въ семъ изданіи не можно мнѣ держаться никакого систематическаго порядка: то, чтобы послѣ можно было расположить изображенія всякому по порядку, какой кому лучшимъ покажется, картишки остаются не замѣчены никакими числами. Статья объ иностранныхъ животныхъ со временемъ можетъ быть исключена, или составить особое собраніе иностранныхъ животныхъ.

Какъ главная цѣль сего изданія состоишъ въ томъ, чтобы по возможности сдѣлать отечественные произведенія Природы болѣе и лучше извѣстными: то я всѣхъ

III

почтеннѣйшихъ читателей, кои по-
рые замѣнить въ описаніяхъ ка-
кую-либо ошибку, или пропущен-
ная обстоятельства въ разсужденіи
образа жизни какого-либо живо-
шаго, пользы онъ него получа-
емой, или вреда имъ причиняемо-
го и проч., покорнѣйше прошу,
буде имъ угодно будеши, присы-
лать свои замѣчанія ко мнѣ, ад-
ресуя письма въ Газетную Экспе-
дицію Московскаго Почтамта,
каковыя замѣчанія приняты бу-
дуть съ особеною благодарно-
стю и, для общей пользы, пожа-
щены въ дополненіяхъ.


Я не имѣль случая видѣть
большей части живошныхъ Рос-
сийскихъ живыхъ, и потому во
многихъ случаяхъ по необходимости
долженъ былъ полагаться на
описанія и изображенія другихъ,
какъ-то: на сочиненія Император-
ской Санктпетербургской Академіи

IV

Наукъ; Императорскаго Общества
Испытаний Природы въ Москвѣ;
а также сочиненія Гг. Палласа,
Гмелина, Георги, Гилденштедта,
Лепехина, Зичева, Озерец-
ковскаго, Фалка, Фишера, Це-
дергильма, Безене, Дримпель-
мана и пр. По препорученію
Университетскаго Начальства и
по другимъ обстоятельствамъ,
 мнѣ самому пощастилилось толь-
ко осмотрѣть, кромѣ Московской
Губерніи, нѣкоторыя мѣста Гу-
берній: Тверской, Смоленской, Мин-
ской, Гродненской, Подольской,
Кіевской, Екатеринославской, Во-
ронежской, Рязанской, Тульской,
Орловской, Курской, Слободско-
Украинской, Полтавской, берега
Азовскаго моря и землю Донскихъ
козаковъ; а посему упомянутыя со-
чиненія суть до сихъ поръ един-
ственнымъ источникомъ касатель-
но сѣдѣній о Россійскихъ живопи-
ныхъ.

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.

№ 1.







Oticechus Rosmarus. L. Mopox.

М О Р Ж Б.

Trichechus Rosmarus, dentibus laniariis superioribus exsertis remotis. LINN.

GMEL. *Syst. nat. I. p. 59. n. I.*

ДВИГУБ. Кратк. опис. животн. че-
твер. Росс. спр. 90.

Trichechus Rosmarus, corpore fusco, nose
retracto laevi. FISCHER *Zoognos.*
III. 636 n. I.

Das Wallrofs. SCHREBER *Säugth.*
II. 262 n. I. t. 79.

The arctic Walrus. PENNANT syn.
quadr. p. 335 n. 263.

Le Morse, ou la vache marine. BUF-
FON *hist. nat. XIII. p. 353.*

Огромное сие животное, которое многие изъ иностранныхъ Писателей, по причинѣ большихъ его клыковъ, подобныхъ слоновымъ, называютъ морскимъ слономъ, обишающъ въ моряхъ сѣверныхъ спараго и новаго Свѣща. Сѣверный океанъ и Ледовитое море, омывающее холодныя спраны Россіи,

супль любимое его жилище. Моржи водятся вездѣ вдоль береговъ Ледовитаго моря, начиная отъ устья рѣки Печоры, даже до Чукотскаго носа, и далѣе въ Восточномъ морѣ около Камчатки, оспрововъ Алеутскихъ, Берингова и Курильскихъ; но въ Восточномъ океанѣ находятъ ихъ не въ такомъ множествѣ, какъ въ Сѣверномъ и Ледовитомъ моряхъ. Самые большие моржи попадаются около Новой Земли, оспрова Манівѣева, чѣмъ между устьемъ рѣки Печоры и Вайгачемъ; также въ Вайгацкомъ проливѣ, а особливо около Чукотскаго носа; а самые мѣлкіе въ Югорскомъ проливѣ, чѣмъ между оспровомъ Вайгачемъ и півердою землею. Въ Бѣломъ морѣ не водятся моржи, но иногда въ него заходятъ; при берегахъ же Мезенскихъ живутъ (*). Вообще же теперъ моржей находятъ не въ такомъ множествѣ, какъ прежде, ибо они, будучи безпрепанно преслѣдуемы промышленниками, удалились въ мѣста совершенно неприспособныя и неизвѣстныя.

(*) Путешествія Академика Ивана Лепекина
Часть IV, спр. 324.

Живопнныя сіи имъють обыкновен-
но длины отъ полуторы сажени до
трехъ саженей, а толщины отъ 4½
до 6 аршинъ. Г. Стедлеръ видѣлъ
моржа длиною почти въ 4 сажени (*).

Голова у моржей кругловата, носъ
плоской, ноздри въ видѣ полумѣсяца,
изъ которыхъ они выбрасываютъ воду
наподобіе китовъ, хотя не съ та-
кимъ шумомъ. Ротъ по величинѣ звѣ-
ря небольшой, губы толстыя, уса-
женныя щетинами, толщиною въ со-
ломину, а длиною около 5 вершковъ.
Передніе зубы малые, задніе зубы по-
же не велики; но два клыка (шишки),
выходящіе изъ верхней челюсти, весь-
ма велики, длиною иногда въ аршинъ,
бѣлы и закривлены внизъ къ груди.
Молодые моржата сихъ клыковъ не
имъютъ. Глаза у моржей маленькие,
кровяные; вмѣсто ушей на самомъ по-
чти запылѣ примѣтны два неболь-
шія слуховые отверстія. Шея тол-
стая, короткая. Туловище въ срединѣ

(*) Steller Sammlung zur Historien von dem
Lande Kamtschatka p. 102.

и полице, а къ хвосту понѣе. Ноги (капшары) очень короткия, широкія, о пяти пальцахъ, копорые между собою соединены кожею такъ, что видны на концахъ ихъ одни только маленькия, острые когти. Переднія ноги обращены къ головѣ, а заднія къ хвосту, копорой очень малъ. Кожа у моржей темнааго, у другихъ же красноватаго цвѣту, полчиною въ палецъ, вся въ морщинахъ и покрыта съточною перепонкою, называемою *Алалера*, опущеною мѣлкими и жесткими волосами пепельного цвѣту, копорые вмѣстѣ съ перепонкою съ убийстваго моржа легко снимаются (*).

Моржи живутъ обыкновенно въ водѣ, гдѣ пишаются морскими поросстями, рыбами и раковинами. Они ходятъ въ морѣ спадами; зрѣніе имѣють шупое, но слухъ и обоняніе превосходныя, ревутъ наподобіе быковъ; они смирны, но отъ непріятелей защищаются съ великимъ оспервенѣніемъ.

Моржи удобно выскакиваютъ на льды или на землю, и медленно пол-

(*) Путешеств. Лепекинъ Ч. IV, стр. 324.

зупъ, зацѣпляясь клыками и передвигаясь посредствомъ переднихъ лапъ. Въ весеннее и лѣтнєе время, когда умножаются морскія вши, великую вѣ морожахъ свербою производящія, то они выходятъ на сушу, на которой долго живутъ, и при солнечной пеплотѣ спятъ очень крѣпко. Одинъ голодъ только заставляетъ ихъ опускаться въ море. Они собираются также на пески и визменные оспрова спадами, во время ихъ любви. Моржи рожаютъ дѣпей по одному, а рѣдко по два; самки кормятъ ихъ грудью, и носятъ въ морѣ придерживая одною лапою.

Великая выгода, получаемая отъ сихъ животныхъ, заставляетъ множество людей заниматься симъ промысломъ; особенно же упражняются въ ономъ Архангелогородской Губерніи жители Мезенского и Кемского уѣздовъ.

Моржей бываютъ въ водѣ, на льдахъ и на сушѣ носками, а также и спрѣлля изъ большихъ ружьевъ. Если зашлютъ ихъ въ большомъ множествѣ на берегу моря, то колюки особенны-

мъ, для сего употребленія сдѣланными
желѣзными копьями. Въ семъ случаѣ
обыкновенно спарапоть преж-
де тѣхъ, которые находятся ближе
къ водѣ, и для воспрепятствованія имъ
бѣжать къ водѣ, засѣпляютъ имъ
глаза, бросая въ нихъ песокъ. Такимъ
образомъ изъ первыхъ убитыхъ моржей
составляется преграда, за которую
переѣзжать заднимъ очень трудно.
Тогда - шо промышленники убиваютъ
всѣхъ осенальныхъ моржей до единаго.

Изъ моржей получають полешую
ихъ кожу, и припомъ довольно мягкую,
выдѣлывающу ее на карешные ремни, гу-
жи и другія подѣлки, а изъ обрѣзковъ
ея вываривають клей. Норманны дѣ-
лали никогда не подверженны никакой
почти порчѣ корабельные канаты изъ
моржевой кожи (*). Подѣ кожею ле-
жащѣ штолстые слои крѣпкаго жиру,
кошораго получается изъ одного звѣря
опѣ 7 до 16 и 18 пудовъ. Вытоплен-
ное сіе сало (ворванное сало) употреб-
ляется на вареніе мыла, пріуголовле-

(*) Blumenbach Handb. d. Naturgesch. p. 129.

ные кожъ, валяніе шерстяныхъ маштей, и пр. Моржевое мясо употребляется промышленниками въ пищу и, по словамъ Стеллера, вкусомъ походиша на свиное (*).

Изъ мѣлкихъ зубовъ дѣлають маленькие ящички, выпачивающъ шашки, марки, ножевые черенья и другія мѣлочи; клыки же, которыхъ пара иногда вѣситъ 50 фунтовъ и болѣе, и некоторые отъ слоновыхъ отпличаються одною только въ срединѣ мраморною желтизною, употребляются на лучшія издѣлія; почему и отправляются они въ Москву, Санктпетербургъ и другіе большия города для рѣзной работы; такжѣ не мало передѣзываютъ ихъ въ Архангельскъ и окружности онаго. Сверхъ этого оппускаютъ и за границу какъ зубы сіи, такъ кожу и сало моржевья; цѣна зубовъ зависитъ отъ ихъ величины. Въ разныхъ мѣстахъ Сибири около Ледовитаго моря находятъ множество моржевыхъ зубовъ, извѣстн-


(*) Stell. Samml. zur Historien v. d. Lande Kamtsch. imp. 107.

ныхъ шамъ подъ именемъ *рѣбъей кости*. Большиe клыки употребляются Чукчами на полозки для саней.

Водяныя животныя вообще не могутъ быть ручными, подобно нѣкоторымъ изъ живущихъ на сушѣ. Но въ Англіи видѣли нѣкогда молодаго моржа, не имѣвшаго еще клыковъ, пойманнаго близъ Новой Земли, коіорый, хотя не охоплено, однако всегда приползалъ къ своему хозяину, когда сей давалъ ему ёспись; кормили же его просяною и овсяною кашицею (*).



(*) *Buffon Hist. nat. par Rene-Richard Castel. t. VI. p. 148.*





Sorex caecutiens. L. Zenephonica cinnam.

ЗЕМЛЕРОЙКА СЛѢПАЯ.

Sorex caecutiens. LAXMAN. *Nova acta Academ. scient. Petropolit.* t. III. p. 285. ДВИГУБСКАГО Крамк. описание животныхъ четвероно-гихъ Россійскихъ, стр. 14.

Blindscheinende Spitzmaus. GEORGII Geograph.-physical. Beschreib. d. Russich. Reichs. t. III. p. 1551.

Киты и слоны суть самыя боль-
шія, а землеройки напротивъ того
самыя малыя животныя изъ всѣхъ жи-
вотныхъ млекопитающихъ. Землеройка
слѣпая вѣситъ не болѣе 35 гранъ, и
величиною гораздо меньше маленькой
мыши.

Рыло у нее длинное, какъ и у
всѣхъ землероекъ, сверху плоское, счи-
зу блѣдноватое, зубы тупые, красно-
ватые; усы умѣренной длины, жест-
кие, и въ большомъ количествѣ. Глазъ

снаружи вовсе примѣтить не можно; да едва ли они и нужны живопному, живущему всегда подъ землею. Не льзя одвакожъ сказать, чиѣбъ совсѣмъ не было, но они чрезвычайно малы, гораздо меньше маковаго зерна, и ихъ тогда только видѣть можно, когда съ толовы снята будеъ кожа. Ушей наружныхъ шакже нѣть, а слуховыя отверстія довольно велики, но закрыты шерстью. Туловище кругловатое, покрытое сверху очень густою бурою шерстью, а на брюхѣ изѣра-синеватою. Лапки о 5 пальцахъ, сѣренкія. Хвостъ тонкой, безъ шерсти, сверху темной, а снизподи сѣроватой, длиною почти съ толовище.

Г. Лаксманъ нашелъ сіе маленькое живопнное только въ Сибири около Байкала; но если мнѣніе Г. Проф. Фишера (*), что слѣпая землеройка не есть особая порода, но одно и то же живопнное съ землеройкою *безхвостою* (**)
(*sorex minutus*), описанною


(*) G. Fischer Zoognos Vol. III. p. 152.

(**) Денгубск. Кратк. опис. животн. четверон. спр. 13.

Лакманомъ же, справедливо: что она должна находиться и въ Губерніи Московской, а можетъ быть и въ другихъ мѣстахъ, что могутъ подтвердить дальнѣйшія наблюденія. Можетъ быть она есть одно и то же животное съ землеройкою *маленькою* (*sorex exilis*) (*), несовершенно еще извѣстною. Вообще испоря землероекъ недостаточна, и можетъ быть, некоторые изъ нихъ, почищаемыя за настоящія породы, суть только выродки другихъ, или однѣ и тѣ же, но разнствующія величиною и цвѣтомъ шерсти по ихъ возрасту и роду жизни.



(*) Тамъ же спр. 14.







Falco leucoccephalus. L. Орел Белокошачий

ОРЕЛЬ БЕЛОХВОСТИКЪ.

Falco leucocephalus, cera lutea pedibusque semilanatis, capite caudaque albis. LINN. — GMEL. t. I. p. 255.

Weiskopfiger Adler. BECHSTE in Ornith. Taschenb. t. I. p. 10.

Le Pygargue BUFF. Hist. nat. des ois. I. p. 99.

Bald Eagle. LATH. syn. p. 29.

Бѣлохвостикъ принадлежитъ къ числу большихъ птицъ орлиного рода, попадающейся величиною не меньше обыкновенного орла, отъ которого отличается цвѣтомъ своего клѣва желтавшымъ или бѣловатымъ, между тѣмъ какъ у орла онъ изчерна-синепѣ, — также и ногами, покрытыми прыями только до колѣнъ. Сверхъ этого лова у него и хвостъ, смотря по возрасту, больше или меньше бѣлые, а роцее тѣло шоколадного цвѣту; пере-

носье желтое, равно какъ и ноги, когти черные.

Бѣлохвостикъ водится въ Европѣ Америкѣ; въ Россіи примѣченъ въ Курляндіи, Лифляндіи, въ Губ. Волынскай Нижегород., Казан., Симбир., Саратовъ Ореабург., Кавказ., въ Сибири и по остро-
вамъ Восточного моря, а вѣроятно и во
многихъ другихъ мѣстахъ, где есть боли-
шіе лѣса. Самецъ и самка выются гнѣзда
вмѣстѣ на высочайшихъ деревьяхъ
или каменистыхъ упесахъ, а чаще
всего близъ большихъ рѣкъ и озеръ.
Гнѣзда сіи бывають шириной въ 3 ар-
шина, а толщиною въ поларшина,
состоятъ изъ разной величины прути-
евъ. Самка кладетъ по два яица, ко-
торыя бѣлы и круглы.

Бѣлохвостикъ силенъ, и ловитъ
большихъ животныхъ, какъ то: моло-
дыхъ дикихъ козъ, зайцевъ, а иногда
ягнятъ и большихъ птицъ, и если
ихъ съ собою унести не можешьъ, то
ожираешь на мѣстѣ; попомъ улѣша-
ешь въ лѣсѣ, и спокойно сидишь на
вершинѣ какого-нибудь дерева. Онъ

прожорливъ, но лѣнивъ. Онъ любитъ также молодыхъ птицелей и рыбъ, которыхъ, по словамъ Г. Пеннанта^(*), часто опинимаетъ у Скопы (*Falco Naiaetus*); ибо увидѣвшіи, ч то она поймала рыбу, до тѣхъ поръ ее преслѣдуетъ, пока она уронитъ рыбу, которую бѣлохвостикъ и подхватываетъ съ невѣроятною быстротою на воздухѣ. Онъ ловитъ также и самъ очень проворно рыбъ въ водѣ; но иногда за свою отважность плашишъ жизнью, схвативши большую рыбу, которой выщацишъ не въ сосѣяніи, и какъ у него когти очень загнуты, и увязаютъ глубоко въ рыбье мясо, то и освободившися не можетъ, почему и опускается съ рыбой въ воду, гдѣ и умираетъ. Егери не любятъ бѣлохвостика, ибо онъ похищаетъ иногда добычу, ими подстрѣленную, прежде нежели они успѣютъ ее взять.

Киргизцы и Калмыки дорого покупаютъ бѣлохвостиковъ, и пріучають

^(*) Europäische Fauna von Goeze B. IV. p. 98.


ихъ кѣ ловлѣ другиxѣ птицѣ и лисицѣ,
а большими перьями оперяютъ свои
спрѣлы.

Когда Калмыки увидятъ лепящаго
бѣлохвостика, то, по увѣренію *Фална*,
наклоняющіяся предъ нимъ очень низко,
ибо, по ихъ преданіямъ, одинъ любо-
пытной Бурханѣ (божокѣ ихъ) обѣхалъ
иѣкогда весь свѣтъ на семъ орль (*).



(*) *P. Falk Beytr. zur topogr. Kentniss d. Russ. Reichs* T. III. p. 327.

еицѣ,
свой
шаго
лка,
зко,
юбо
халѣ
*)..



Cottus scorpio. L.

Ranua Rabua.

РАМША РЯВЦА.

Cottus scorpius, capite spinis pluribus,
maxilla superiore paulo longiore.

GMEI — LINNE T. I. pag. 1210.
Donner-kröte. BLOCH. Deutschl. Fischer.


2. p. 18.
Le cotte scorpion. BLOCH. ibidem.
Father lasher. PENN. Brit. Zool.
III. p. 179. n. 3.

Рыба сія есть одна изъ тѣхъ, ко-
торыхъ хотя красива, но странная на-
ружность заставляетъ многихъ людей
думашь невыгодно и о внутреннемъ
ихъ достоинствѣ. Множество мѣлкихъ,
но острыхъ бородавокъ, которыя нахо-
дятся по всему ея тѣлу и могутъ поко-
лоть штого, кто не осторожно возмѣтъ
её въ руки, подали поводъ почитать ее
вредною. Она водится въ Балтийскомъ
морѣ, въ Ледовитомъ океанѣ, около
устья реки Оби, около острововъ оке-
ана Восточного, и въ Черномъ морѣ
около Крыма и Николаева. Рявица бы-

ваєтъ длиною въ поларшина. Голова у ней, какъ и у всего рода Рамши, шире тѣла, и усажена многими колючими бородавками, изъ коихъ двѣ мягкия находятся передъ глазами, которые у ней велики и лежатъ на щемѣ; зрачокъ въ нихъ черной, а радужная оболочка желтоватая. Ротъ ея широкъ, снабдены множествомъ зубовъ; верхняя челюсть длинѣе нижней, и обѣ подвижныя. Опьверсии жаберное большое, косточки плавательныхъ перьевъ грудныхъ и брюшныхъ проспты, а хвостового пера на концѣ раздвоенные; плавательные спинные перья имѣютъ ихъ по 10, 16, боковые по 17, грудные по 15, брюшные по 12, а въ хвостовомъ перѣ ихъ 10. Все тулowiще сверху испещрено щемными пятнами и полосками, а брюхо беловатое. Боковая черта прямая и идетъ почти близъ спины; плавательные перья красноваты съ белыми пятнами, а у самки онъ беловаты съ черными полосками (*).

(*) На картинахъ изображена самка.

Она плаваетъ чрезвычайно быстро, и находиться въ безпресшанномъ движении. Обыкновенное ея жилище сушъ глубины морскія, откуда поднимается для доспаванія себѣ пищи, а въ началѣ весны выходитъ къ берегамъ для бросанія икры. Она очень прожорлива и питающаимъся другими рыбами, на которыхъ отважно нападаетъ, и нерѣдко на такихъ, которыхъ гораздо ея сильнѣе; есть также и раковъ. Когда поймаютъ ее, то издаещъ глухой споанъ. Ловятъ же ее сѣпями и удками. Она вкусна, но въ пищу рѣдко употребляется по спраннымъ предразсудкамъ.



A. A.



Ornithorhynchus paradoxus. B.L. Птиконосъ.



П Л О С К О Н О С Ъ.

Ornithorinchus paradoxus. BLUMEN-BACH Handb. der Naturgesch. 1803.

p. 128.

FISCHER Zoognos. V. III. p. 689.

Das Schnabelthier. BLUMENB l. c.

*Bec d'Oiseau. BUFFON - SONNINI.
tom. 34. p. 247.*

Въ сочиненіяхъ древнихъ упоминается о живопионѣ чепвероногомъ, имѣвшемъ львиное шуловище и орлиную голову; новѣйшіе испытатели природы причислили его къ живопионѣмъ баснословнымъ, да и вообще почитали прошивнымъ порядку природы, чтобы живопионѣ чепвероногое имѣло птичью голову.

Но, ко всеобщему удивленію, за нѣсколько лѣтъ предъ симъ изъ Новой Голландіи, споль богатой странными произведеніями природы, привезено въ Европу живопионѣ чепвероногое, хотя

не съ орлиною головою, но съ рыломъ
весьма похожимъ на ушиной клібъ.

Плосконосъ вообще походиша на
маленькую выдру; рыло же его подоб-
но ушиному клібу. Оно плоское, широ-
кое и спереди округленное, состоящее
изъ рогового толаго вещества съ за-
краинами при основаніи; внутри об-
шито кожицею, имѣющею множества
чувственныхъ жилокъ, изъ чего и за-
ключающе, что рыло служитъ плос-
коносу также и орудіемъ осязанія при
исканіи пищи въ водѣ, подобно клібу
ушиному. По краямъ челюстіи примѣни-
ны маленькие хрящеватые зубы, не въ
гнѣздахъ утвержденные, какъ у жи-
вотныхъ четырехногихъ, но только
сросшиеся съ деснами. Верхняя че-
люсть нѣсколько длиннѣе, шире ниж-
ней, и имѣетъ ноздри. Уши едва при-
мѣшны; глаза очень малые съ боковою
перепонкою, какъ у птицъ. Туло-
вище продолговатое, цилиндрическое,
къ плечамъ тонкое, къ заду толще.
Оно покрыто мягкою лоснящеюся
шерстью, на спинѣ чернобураго цвѣ-

та, а на брюхѣ серебристаго. Хвостъ плоской, покрытъ жестокою, щепинъ подобною шерстью. Пальцы на переднихъ лапкахъ голые, а на заднихъ покрыты сѣроватою шерстью до самыхъ когти; всѣ они соединены плаващельною перепонкою, которая, при разжатіи пальцовъ на переднихъ ногахъ, распягивается наподобіе опахала. Долгіе когти переднихъ лапокъ загнуши вверхъ, а заднихъ закривлены внизъ; у самца на заднихъ лапкахъ есть еще по шестому подвижному когти.

Спроеніе внутреннихъ частей сего живошнаго споль же спранно, какъ и устроеніе рила. Нѣкоторыя части совершенно сходны съ частями животныхъ чепвероногихъ; а другія подходять ближе къ частямъ птицъ, и даже пресмыкающихся, такъ что Гомъ и другіе испытатели природы думаютъ, что сии животные должны родиться не живыхъ дѣней, подобно прочимъ млекопитающимъ животнымъ,

но подобно ящерицамъ; аккуламъ
проч.

Все животное длиною въ полар
шина; но самка меньше самца.

Плосконосы водятся только въ
пресныхъ озерахъ Новой Голландіи,
всплывающъ на поверхность воды въ
то время, когда почувствуютъ нужду
въ воздухѣ; по землѣ пресмыкаются
медленно, подобно черепахамъ, потому
что ноги у нихъ очень коротки.

Чѣмъ они питаются, неизвѣстно;
но, судя по строенію органовъ, для пи-
танія определенныхъ, можно думать,
что они питаются насекомыми вод-
ными и червями.



ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ,

издаваемыя

иваномъ Двигубскимъ.

Optamus
*Fumum de patriis . . . videre focis ,
Nescio , qua natale solum dulcedine captos
Dicit*

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

М О С К В А.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1817.


Печатанъ позволяется, съ представле-
ниемъ 5 экземпляровъ въ Цензурный Ко-
митетъ для казенныхъ мѣстъ. Москва,
Марта 2 дня, 1817. О. П. Надворный
Совѣтникъ и Кавалеръ Лесъ Цвѣтаевъ.

e
o
i
й

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ.



№ 2.



Bos Grunniens. *Длинношерстное быко.*



ДЛИНОШЕРСТНЫЙ БЫКЪ.

Bos grunniens, cornibus teretibus, introrsum curvatis, vellere propendente, cauda undique jubata. LINNE GMELIN. Syst. nat. t. 1. p. 265.

ДВИГУБСК. Кратк. опис. живот., четверон. Росс. спр. 79.

Ziegenochse. BLUMENB. Handb. d. Naturg. p. 115.

Vache de Tartarie. BUFFON Hist. Nat. t. XV, p. 136.

Grunting bull. PENNANT Syn. quadr. p. 3.

Длинношерстный быкъ, иначе называемый Тибетскимъ, Тангутскимъ и Монгольскимъ, есть живоцное весьма полезное для жишелей Восточной Азіи, где въ домахъ разводится съ очень давнихъ временъ: Кромъ Тибета, Китая, Индіи и другихъ иностранныхъ земель, держатъ его и разные Сибирскіе

народы; да и дѣйствительно живописныя сіи составляютъ весьма важную статью въ домоводствѣ; ибо, кроме пользы, получаемой отъ нихъ, какъ отъ обыкновеннаго рогатаго скота, состоящей въ молокѣ, сырѣ, маслѣ, мясѣ, кожѣ и употреблениіи въ работу, длинная и мягкая ихъ шерсть служитъ для шканья разнаго плащья; а хвостъ, состоящій изъ длинныхъ сребристо-блѣлыхъ и мягкихъ волосовъ, но упругихъ подобно лошадинымъ, составляетъ драгоценной шоварѣ, — предметъ роскоши въ разныхъ мѣстахъ Китая, Индіи, Тибета, Турціи и проч. Чѣмъ волоса сіи длиннѣе, тѣмъ дороже про-даются. Китайцы, окрасивши ихъ въ алой цвѣтѣ, употребляютъ для кистей на лѣпнія свои шляпы; а въ другихъ мѣстахъ убираютъ ими парадныхъ слоновъ и лошадей, или употребляютъ для дѣланія почепныхъ знаковъ (бунчуки) военныхъ чиновниковъ, какъ на примѣрѣ въ Турціи. Изъ сихъ волосовъ въ Индіи, по утвержденію нѣкошорыхъ, шкуры

лучшія шали (*). Въ дикомъ состояніи быковъ сихъ находѧшъ въ Тибетѣ, гдѣ ихъ называють: якъ; также водятся они во владѣніяхъ Калмыцкихъ, и забѣгающіе оштуда, хотя весьма рѣдко, въ Сибирскія пограничныя степи. *Фалкъ* (**), думаешьъ, что можно сихъ полезныхъ животныхъ разводить около Терека, Дона и проч., гдѣ уже давно разводятся буйволы, отъ которыхъ они, по мнѣнію *Палласа* (***) , происходящіе, хотя *Пеннанть* и полагаетъ, что они суть выродки обыкновенной рогатой скотины (****).

Длинношерстный быкъ и корова сходны видомъ съ обыкновенными быками и коровами, особенно мѣлкими. Животные сихъ длиною бывающіе въ два аршина, а вышиною въ полтора. Голова ихъ больше подобна буй-

(*) *Bilderbuch für Kinder, von Berthuch.* Vol. II.
n. 17.

(**) *P. Falk Beytr. zur topogr. Kenntn. d.
Russ. Reichs* B. III. p. 295.

(***) *Acta Acad. Scient. Imperial. Petropolit.* pro
anno 1777. V. II. p. 245.

(****) *G. Fischer Zoognosie* Vol. III. p. 376.

воловой; морда у нихъ шупая, губы
шоксныя, уши большія острывы, по-
крытыя жесткими волосами; рога ко-
роткие, круглые, острывыми, загнутие
назадъ; есть однокожъ быки и коровы
безрогіе. Между рогами на лбу находи-
ся прядь длинныхъ курчавыхъ волосъ,
которые на самой срединѣ лба распо-
ложены звѣздочкою. Туловище все по-
крыто длинною шерстью, подобно козь-
ей, особенно же шерсть на брюхѣ
очень длинна, и виситъ ниже колѣнъ.
Хвостъ походитъ на лошадиной,
состоитъ изъ длинныхъ, тонкихъ,
мягкихъ, но упругихъ волосъ, и бы-
ваютъ иногда длиною въ шесть фу-
товъ (*).


Цвѣтъ шерсти на всемъ тѣлѣ чёр-
ной; а лобъ и верхняя часть шеи бѣло-
ваты; выдавшееся на спинѣ возвышеніе
и хвостъ бѣлыя. Но попадаются какъ
быки, такъ и коровы совершенно чёр-
ные (**), и даже съ чёрнымъ хвостомъ.


(*) Acta Acad. Petropolit. Vol. II. p. 249.

(**) Ibidem.

Животиия сии пишаюся правою,
и вообще родъ жизни ведутъ какъ и друго-
й обыкновенной рогатой скотѣ; зною не
шерпяшъ, но любятъ мѣста пѣнистые
и часпо купаются въ водѣ подобно
бульволамъ. Они очень сердиты, даже и
ручные не терпяшъ, чтобы незнако-
мые люди, кромъ тѣхъ, которые смо-
трятъ за ними, подходили къ нимъ
близко; особливо же не любятъ кра-
снаго и желтаго цвѣтовъ. Когда ихъ
раздразняшъ, то все тѣло ихъ при-
ходишъ въ дрожаніе, хвостъ подни-
маешся вверхъ и находится въ безпре-
рывномъ движеніи, глаза показываютъ
яростъ, и они вдругъ бросаютъ на
того, кто ихъ дразнишъ. Голосъ ихъ
похожъ на свиное хрюканье. Быки хрю-
каютъ гораздо рѣже, нежели коровы.









Ura chloroptera. L.

Macawana.

М Ы Ч А Г А Т К А.

Alca cirrhata, tota nigra, rostri sulcis quatuor, capitis lateribus, area oculorum, anguloque gulae albis, cirrho a superciliis ad nucham longitudinali flavescente. LINNE GME-LIN. Syst. Nat. t. 1. p. 553, n. 10.
Schwarze Alke. GEORGI geographisch-physical. und naturhist. Beschreib. d. Russ. Reichs. V. III. p. 1751.
Macareux de Kamtschatka. BUFFON Hist. nat. des ois. t. 9. p. 368.
Tufted Auk. LATHAM. Syn. III. p. 313.

Мычагатка занимаетъ не по-
следнее мѣсто между рѣдкими птица-
ми, достойными особенаго вниманія
испытателей природы. Она величи-
ною едва превышаетъ домашнюю ушку.
Клювъ ея нѣсколько сжатъ. Верхняя че-
люсть остра, и на концѣ загибается
немного внизъ; а нижняя шуная. Зад-

ия часть верхней челюсти отдаляетъ ся отъ передней довольно большою бороздою. При самомъ корнѣ кліова примѣчаются цвѣтная хрящеватая перепонка (переносъ), отъ которой по верхней части его продолжается особое возвышение до самой бороздки. Передняя часть кліова имѣетъ также двѣ поперечные бороздки (у самца ихъ три). Сии разныя части кліова покрыты различными цвѣтами. Передняя часть до третьей бороздки красного цвѣту; а задняя часть верхней челюсти желтоватая; продолжавшее на ней возвышение желто-зеленое, а переносъ желтоватое. Продолжавшая ноздри находятся въ задней и нижней части верхней челюсти. Глаза темножелтые.

Мычагашка вся черного цвѣту, но цвѣтъ сей на брюхѣ, а особливо на груди, не иакъ теменъ; притомъ же каждое перо, и болѣе пухъ, къ концу своему свѣтлѣе. Голова ея также черна; но по бокамъ и около глазъ даже до глошки покрыта белымъ пухомъ. Длин-

ныя космы, изъ нѣжныхъ и весьма мѣлкихъ перьевъ желтаго цвѣту, начинаящіе спѣ бровей и висячіе вдоль шеи даже до спины.

Крылья короче хвоста, сверху черныя, снизу бѣловаты, на плечахъ имѣютъ также бѣлую полосу. Хвостъ короткой черной и состоящій изъ 16 перьевъ. Ноги краснаго цвѣту, и находящіеся ближе къ хвосту; онѣ имѣютъ по три пальца, соединенныхыхъ между собою перепонкою.

Птицу сію первой примѣтилъ Стеллеръ, потомъ Крашенинниковъ, а описалъ Палласъ. Она живетъ въ морѣ, омывающемъ Камчатку и острова Курильскіе. Она цѣлой день проводитъ на морѣ плавая, ныряетъ очень хорошо, лепаетъ быстро, но никогда не удаляется отъ осоловъ и подводныхъ камней; почто же прилепаетъ на сушу. Пища естъ раками и разными раковинами. Для вочлеговъ своихъ выдалбливаетъ кливомъ въ неприспупныхъ утесахъ ворку, часто глубиною болѣе полуаршинна. Такимъ

образомъ самецъ и самка noctuonъ вмѣстѣ. Въ сихъ же норахъ самки, успавши ихъ мягкимиправами и пухомъ, несущимъ по одному яицу въ годъ около конца Мая, или начала Июня. Яйца въ отношеніи къ самымъ птицамъ очень велики, ибо они больше упинныхъ и немного менѣе гусиныхъ, продолговаты, цвѣтомъ бѣлы, и притомъ очень вкусны; для чего Камчадалы и другие шамошные народы доспаютъ ихъ изъ гнѣздъ, хопя и съ великимъ трудомъ, ибо кромѣ неприспособности самыхъ норъ, буде самка въ то время находящаяся въ ней, чрезвычайно больно дерется кловомъ. Мясо сихъ птицъ жестоко и невкусно. Жинели Алеушскихъ и другихъ шамошныхъ острововъ употребляютъ шкурки сихъ птицъ себѣ на плащье, а нижнюю челюсть иногда для украшения своихъ одеждъ, а иногда вѣшаютъ на шею, и носятъ, какъ предохранительное средство отъ разныхъ непріятныхъ случаевъ. *Мычагаткою* называють ее въ Камчаткѣ а *Игилмою* въ Охотскѣ.



д
в
о,
ло
да
нъ
и
а-
нъ
и
е
в
о-
е-
т
в
о-
нъ
а
о-
нъ
и
е



Acipenser Sturio. L.
Ocymphos.

О С Е Т Р Ъ.

Acipenser sturio, rostro obtuso, oris diametro transverso longitudini aequali, cirris rostri apici propioribus, labiis bifidis. *LINN-GMELS* yst nat. t. 1. p. 1483.

Stöhr. *BLOCH Deutschl. Fisch.* 3. p. 89. et squ.

L'Esturgeon. *BLOCH ibidem.*

Sturgeon. *Bloch ibidem.*



Рѣдкая рыба доставляетъ столь много выгодъ промышленникамъ, какъ осенръ; а потому симъ промысломъ занимается не одна тысяча людей.

Осенръ есть рыба морская, и находится не только во всѣхъ моряхъ, омывающихъ Россійскія владѣнія, но кроме того въ Каспійскомъ и въ Байкаль. Въ открытихъ моряхъ рѣдко ловятъ осенровъ, а только подъ береговъ иногда,

куда они забѣгаюшъ, гоняясь за добычею, а чаще въ рѣкахъ, въ которыхъ они заходяшъ изъ морей, и притомъ очень далеко, для мешанія икры. Ка-
спійское море больше всѣхъ изобилуетъ осетрами, изъ котораго они выхо-
дятъ въ Волгу, Уралъ, Куру, Терекъ
и въ рѣки въ нихъ впадающія. Такимъ
образомъ ловяшъ осетровъ не только
въ водахъ Губерній Астраханской, но и
въ Саратовской, Симбирской, Казаш-
ской, Нижегородской, Костромской,
Ярославской, Кавказской и Оренбургской.
Изъ Чернаго и Азовскаго морей осетры
выходяшъ въ Бугъ, Днѣстровъ, Днѣпръ
Донъ и Кубань и въ рѣчки съ ними со-
единяющіяся, а потому и ловъ имъ бы-
ваешъ, кромѣ земли Донскихъ козаковъ,
въ Губерніяхъ Екатеринославской, Хер-
сонской, Таврической, Киевской, По-
дольской и Волынской.

Въ Балтийскомъ морѣ осетровъ не
шакъ много, но они шакже заходяшъ въ
рѣки въ него впадающія, почему и промы-
шляютъ ими во всѣхъ Губерніяхъ се-
му морю прилежащихъ. Изъ Сѣвернаго

океана осетры заходятъ въ Обь, Енисей, Лену и другія большія рѣки, почему ловятъ ихъ во многихъ мѣстахъ всей Сибири. Но самой прибыльной ловѣ сихъ рыбъ бываетъ въ рѣкахъ Волгѣ, Уралѣ, Дону и Днѣпрѣ. Для такой ловли, съ копсрою вмѣстѣ ловятся и другія большія рыбы, какъ по бѣлуга, севрюга, сомъ и пр., употребляються различные снасти, у Россійскихъ промышленниковъ известныя подъ именами городьбы, езей, неводовъ, сѣпей, погоняевъ, волокушъ, кармакановъ, переметовъ съ желѣзными крючками, багровъ, мордѣ и проч. (*). Въ разныхъ мѣстахъ ловятъ осетровъ не въ одинакое время, но смотря по тому, когда бываетъ ихъ больше. На Волгѣ, гдѣ ловятъ ихъ всегда самой прибыльной, пойманныхъ осетровъ лѣтомъ и осенью большею частию сажаютъ

(*) *Паллас* пушненскій Ч. I. стр. 203 и слѣдующ. *Лепекинъ* пушненскіи записки. Ч. I стр. 249 и слѣд. С. Гмелина пушненское по Россіи. Ч. II. стр. 282 и слѣд.

въ садки, которые не что иное суть какъ великия озера, находящіяся подъ Волги; при наступлении же зимняго пущи вылавливаютъ оныхъ неводами, развозяще въ разныя мѣста (*).

Осетры принадлежатъ къ весьма большимъ рыбамъ; бывающіе длиною въ аршинъ, два аршина и болѣе, а вѣсомъ отъ двухъ пудъ до шесши.

Голова у осетра оканчивается длиннымъ шупырьмъ рыломъ, и покрыта косшами, подъ кошорыми прочее вещество, составляющее черепъ, хрящеваше. Ротъ находится подъ рыломъ зубовъ не имѣющій, и вмѣстѣ губъ окружены двойнымъ выдвижнымъ хрящемъ. Предъ ртомъ висяще чешуе усика. Ноздри находятся близъ глазъ, имѣющихъ желтую радужную перепонку. Жаберные отверстія, которыхъ съ каждой стороны головы по одному, большіе а крышечки ихъ состоящіе изъ косшаго листочка, съ бороздками на поверхности, расходящимися въ видѣ лучей.

(*) Путешественныя записки Г. Лепекина Ч. I. стр. 246. Палласа путешеств. Ч. I. стр. 200.

Туловище прямое, широкое, оканчивающееся тонкимъ косымъ хвостомъ. Кожа на немъ вся усажена мѣлкими едва примѣнными жесткими косточками. На спинѣ находятся отъ 11 до 13 большихъ жучекъ (косточекъ); два ряда такихъ же косточекъ находятся по бокамъ, и два ряда по краямъ брюха, отъ чего осетровое шѣло представляетъ пятисторонникъ. Жучки сіи сушь косточки, при основаніи широкія, но къ верху мало по малу суживающіяся и оканчивающіяся закривленнымъ оспріемъ. На широкой части примѣнны бороздки, расходящіяся въ видѣ лучей. Плавашельныхъ перьевъ у осетровъ по 5; въ боковыхъ перьяхъ щипается по 13 косточекъ, въ грудномъ 5, въ брюшномъ и хвостовомъ по 25, а въ спинномъ перъ 38. Спина осетровая, а особенно бока, изъра-синеваты съ шемными, а ниже съ черноватыми точками, а брюхо белое. У живыхъ осетровъ бока красноваты; но по смерти сей цветъ пропадаетъ. Цветъ боковыхъ плавашельныхъ перьевъ подхс-

дитъ къ оранжевому, а по краямъ черной; прочія же перья черноваты, съ желтоватыми краями.

Осетры питаются мѣлкою рыбой, раками и червями. Они чрезвычайно плодущи, и въ Апрѣль мѣсяцѣ и Маѣ поднимаются спадами въ рѣки, гдѣ прутся о берега, и выпускаютъ икру. Левенгѣнъ нашелъ въ осетровъ самкѣ 150,000,000,000 яицъ.

Изъ осетровъ ничего не бросаютъ, даже самые попрохи употребляются въ пищу. Осетриное же мясо, какъ всѣмъ известно, составляетъ вездѣ весьма вкусную пищу. Древніе Греки и Римляне очень дорогою цѣнью покупали осетровъ, и споль высоко почитали ихъ, что когда подавали на столъ (разумѣется у самыхъ богатыхъ и роскошныхъ людей), то украшали ихъ разными цветами; и самые прислужники, по свидѣтельству Плинія, подающіе осетрину на споль, имѣли головы увѣнчанныя цветами, и были предшествуемы инструменталью музыкою. Овидій не даромъ на-

зываютъ осетра *благороднымъ*: Такъ
же *peregrinis Acipenser nobilis undis* (*).

Осетры не только съѣжіе употреб-
ляются въ пищу, но ихъ солятъ и
провѣшиваютъ, а особливо спинки ихъ.
У осетровъ, которыхъ хотятъ солить,
вынимаютъ спановую жилу изъ спи-
ны, сушатъ, и продаютъ ее подъ име-
ніемъ *вязиги*, или везиги. Она упо-
требляется въ пищу.. Изъ осетровыхъ
пузырей делаютъ очень хороший ры-
бий клей. Пузыри сіи провяливаютъ,
потомъ кладутъ въ чистое полотно,
и мнутъ до тѣхъ поръ, пока верхняя
кожица отстанетъ, и тонкія жилоч-
ки вымнувшись опадѣлятся. Внутрен-
няя съѣплая и бѣлая кожица есть на-
стоящій чистый клей, который сви-
гаютъ въ разныя фигуры и сушатъ.
Осетровой клей щипающій лучшимъ
бѣлужьяго, а хуже сперляжьяго и се-
рюжьяго.

Икру въ зимнее время развозятъ
прѣсную, но также и солятъ, а осо-

(*) *Bloch. Hist. nat. des poissons, edit. par Castel,*
t. VIII. p. 152.

бливо лѣтомъ и осенью. Вынущая икра
въ заморозы пропирается чрезъ про-
во чное рѣшето такъ, чтобы однѣ
только проходили зерна, а перепонки
и жилки осипавались; потомъ кладется
въ нее нѣсколько соли; такая икра
называется *зернистою малосольною*,
отъ которой *засольная* отличается
большимъ только количествомъ соли.
Паисная икра приготавляется безъ
пропиранія чрезъ рѣшето; но ее вы-
нувъ изъ рыбы, кладутъ въ крѣпкой
разсолѣ, потомъ на лубьяхъ разспилы-
ютъ, и высушивъ до суха на солнцѣ,
поливають рыбьимъ жиромъ и скла-
дываютъ въ бочки. *Мѣшечную* икру
пропираютъ чрезъ рѣшето, кладутъ
въ крѣпкой разсолѣ, изъ которого вы-
черпавъ, наполняютъ холщевые мѣшеч-
ки, завязываютъ ихъ шуго, кладутъ
подъ гнетъ, где и держатъ до тѣхъ
поръ, пока икра сложется. Изъ осет-
ровъ отдѣляютъ также при соленіи
жиръ, который особо выплывающій
и употребляютъ лучшій въ пишу,
похоже для горѣнія вмѣсто сливъ.



pa
po
ні
кі
са
па
ю
са
н.
зб
бі
од
з
з
а
и
лі
бі
ч
і
лі
лі
лі
лі
лі
лі



Lucanus Cervus L.

D. Drury

РОГАЧЬ ОЛЕНЬ.

Lucanus cervus; scutellatus: maxillis exsertis, apice bifurcatis, latere undentatis. LINNE.-GMEL. Syst. nat. t. 1. p. 1588.

Der Hirschschröter. GOEZ Schädi. Gesch. Ins. p. 220.

Le grand cerf-volant. GEOFFR hist. ins. Paris. I. p. 61. n. 1.


Насекомое сие, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи Туромъ называемое, есть изъ числа самыхъ большихъ насекомыхъ Россійскихъ. Рогачь длиною бываетъ вершка въ три. Голова у него большая плоская, почти четырехугольная; челюсти длинныя, съ однимъ большимъ опросникомъ на внутренней сторонѣ и со множествомъ мѣлкихъ зубчиковъ; онъ у самца на концѣ раздвоющеся, и вообще походяшъ на олены рога, во рту видны 4 неровныхъ щупальца, и язы-

чокъ вѣ видѣ кисточки; глаза круглые; усики сплющенные, и наподобіе гребешка раздѣляющіеся, длиною съ грудной щитокъ, которой широкъ и имѣетъ четырестороннюю Фигуру. Надкрылья жесткія выпуклые; крылья мягкие, желтые, прозрачные; брюхо большое, продолгованое, плоское; ноги крѣпкія, способныя къ бѣганію. Все насѣкомое цвѣту чернаго или каштановаго; особенно голова и грудной щитокъ всегда черныя, язычокъ желтоватой.

Рогачь находится по всей Россіи, гдѣ только есть дубовые лѣса, и лѣтаетъ только вечеромъ и ночью, особенно вѣ Июнь и вѣ Июль. Самка его кладетъ темные продолговатыя яйца вѣ гнилых деревьевъ; изъ сихъ лицъ выходятъ большія бѣловатыя гусеницы, съ головою и ногами каштановаго цвѣта; они питаются деревомъ и кореньями. Римляне, по свидѣтельству Плінія, употребляли ихъ вѣ пишу. Гусеницы, по изпеченіи, шелши лѣти, приготовляютъ себѣ новое вѣ землѣ жилище, и превращаютъ

ся въ куколку, изъ которой по про-
шествіи двухъ или трехъ мѣсяцовъ
выходяще совершенныя уже насѣкомыя.
Въ семъ состояніи они живутъ только
до осени. Рогачи больно кусаются сво-
ими большими подвижными челюстями,
если возмешься за нихъ неоспорожно.
Самка меньше самца и такихъ боль-
шихъ челюстей не имѣещъ.

en de vader van
gehoort gheen van
het oock dat vaderschaps
zoon dient en hoeft, een
vaderschap dat niet
volledig is niet een
vaderschap dat niet





L'Orme co l'herbe au



ЛЬВИЦА СО ЛЬВЕНКАМИ.

Изображенія львовъ находятся во всѣхъ почти книгахъ Естественной Исторіи; но изображеніе львенковъ, и пришомъ самое вѣрное (я самъ видѣлъ ихъ живыхъ въ бытность мою 1804 года въ Парижѣ), представляется еще въ первой разѣ Россійской Публики.

Львы, животный споль извѣстны по своей величественности и гордой осанкѣ, по своей отважности и силѣ, по спремищельности въ движеніяхъ, ужасной лютости въ гнѣвѣ, давно уже описаны естества-испытателями, воспѣты стихониорцами, обоготовлены миѳологами, и поставлены въ небѣ эмблемою могущества лѣпняго солица. Во всѣ времена и во всѣхъ странахъ они были и суть предметомъ любопытства; почему и содержать ихъ въ звѣрицахъ. Нѣкогда представляемы они были соп-

иями на народныхъ зрелищахъ, ихъ выводили на сражения и украшали ими пріумфы славнейшихъ въ древности завоевателей.

Левъ самецъ въ физиономіи своей являетъ какую-то смѣсь благородства, увѣренности и отважности, а львица болѣе пріятности и легкости. На головѣ львицы вѣтвь длинныхъ и густыхъ волосъ, которыми украшена голова и шея льва. Она не такъ спокойна какъ левъ, но за то имѣетъ болѣе пріятности въ чертахъ своего лица, и болѣе гибкости въ движеніяхъ. Она менѣе льва и, можетъ быть, не столько сильна, но быстрота замѣняетъ въ ней силу. Она ходитъ на концахъ только пальцовъ, подобно льву, дѣлаетъ быстрые скачки, и подобно ему перескакиваетъ за одинъ разъ большое пространство на пять и на шесть шаговъ; но, кажется, что прыжки ея еще быстрѣе, и вообще порывы спремиальне нежели у самца.

Шерсть на львицѣ, какъ и на львѣ, рыжевата и безъ пятенъ, притомъ вездѣ короткая, выключая нижней ча-

спи шеи и клочка длинныхъ волосовъ, находящихся на концѣ хвоста. Львица споль же отважна, какъ и левъ; особенно голодная нападаетъ на всѣхъ звѣрей, которыхъ можетъ поймать, но еще спрашнѣе бываетъ въ то время, когда кормитъ молокомъ своихъ львенковъ. Да и можно ли удивляться, что сей звѣрь въ такое время дѣлается гораздо отважнѣе, когда видимъ и самыхъ робкихъ самокъ въ другихъ родахъ животныхъ съ необыкновенно неуспрашимостю защищающихъ дѣтей своихъ? Въ сие-то время львица отважно сражается съ такими звѣрями, которые ея сильнѣе, каковы суть шигры, слоны, носороги и бегемоты, и одолѣваеніе ихъ.

Въ лѣсахъ Африканскихъ и въ пустыняхъ жаркихъ странъ она питается обыкновенно сайгами и нѣкоторыми обезьянами. Для пойманія добычи, очень часто принуждена бываетъ прибѣгать къ хитростямъ, скрывать свои преслѣдованія, лежать на брюхѣ, пришаившись въ высокой травѣ, и дожидаться какого-нибудь звѣря, который проходилъ бы мимо.

Въ то время она выскакиваетъ изъ своей засады, въ нѣсколько прыжковъ догоняетъ добычу, умерщвляетъ ее, раздробляетъ кости, и раздирая по частямъ, пожираетъ. Она любишъ мясо животныхъ, ею самою пойманныхъ, и никогда не ъестъ мертвыхъ звѣрей, а особенно вонючихъ ихъ ошатковъ, развѣ будешъ шомима необычайнымъ голодомъ; равно никогда не умерщвляетъ такого множества звѣрей, какъ тигръ и барсъ.

Люди сражаются и побѣждаютъ львовъ, но болѣе посредствомъ спрашныхъ ими изобрѣтенныхъ оружій, поражающихъ издалека и съ быстротою молніи, или при помощи великаго числа крѣпкихъ собакъ и при помѣшь съ лошадьми, къ такой охотѣ нарочно пріученными.

Львы, живущіе въ пустыняхъ, не устращимъ живущихъ въ лѣсахъ близкихъ къ селеніямъ, гдѣ они по печальнымъ опытамъ теряютъ чувство своей силы, и признаютъ превосходство человѣческаго искусства. Люди не только имѣютъ средство побѣждать сихъ спрашныхъ звѣрей и убивать ихъ;

но они ловяшъ ихъ, дѣлаютъ ручными и покорными, вселяюшъ въ нихъ привязанность съоль сильную и продолжительную, что сіе страшное впрочемъ животное превращается въ благородного друга, произвольнаго госпя и свободнаго въ домъ жищеля. За нѣсколько лѣтъ видѣли въ Константинополѣ льва, жившаго въ домѣ одного Турецкаго вельможи, которой находился въ его покояхъ въ такой же свободѣ, какъ и другое животное самое смирное и самое вѣрное (*).

Впрочемъ львы привыкаютъ не только къ людямъ, но и къ другимъ нѣкоторымъ животнымъ. Я самъ видѣлъ въ Парижскомъ звѣринцѣ молодую собаку, очень дружно жившую въ одной клѣткѣ со львомъ; въ другой же клѣткѣ жила собака со львицею, которая не только не была къ ней зла, но, по видимому, даже любила ее; ибо она забавлялась ея игривостью, любовалась ея приходами, чувствовала ея ласки, при-

(*) La Menagerie du Muséum national d'Histoire naturelle, à Paris 1804 T. I. p. 161.

мѣчала ея нужды, печалилась, когда брали ее опѣе нее на нѣсколько минутъ, и радовалась, когда опять кѣ ней впушали. Вѣ однъ только время, когда давали ей ъесть, она входила вѣ свои права, природою ей даныя, и не терпѣла даже приближенія собаки кѣ ней; и сія послѣдняя, какѣ бы зная всю опасность, которой могла бы подвергнуться, лежала спокойно вѣ углу клѣшки, пока лѣвица, утоливши свой голодъ, позволяла ей ъесть хлѣбъ, для нее принесенный. Вѣ другое же время она не сердилась, когда собака кусала ее и за рыло.

Лѣвиной ревѣ состоятъ изъ продолжавшихъ звуковъ, довольно толстыхъ, смѣшанныхъ съ звуками оспрыми и нѣкоторыми дрожаніемъ. Онъ бы ваетъ различенъ, какъ по своему продолженію, такъ по высотѣ и низотѣ тоновъ, смотря по возрасту животнаго, по спрастямъ, которыя его волнуютъ, по спешени гнѣва, которої имѣютъ, по нуждамъ, которыя имѣютъ, по жару, которої его разгорячаютъ,

но холоду, кооторый его беспокоитъ,
и проч. (*).

Львы въ состояніи дикомъ выходитъ изъ своихъ логовищъ только ночью, чтобы избѣжать солнечныхъ лучей, пагубныхъ для нѣжныхъ глазъ ихъ, и чтобы удобнѣе ловить въ тьмнотѣ свою добычу, днемъ же спятъ. Но въ состояніи неволи нѣтъ имъ надобности искать ночью своей пищи и укрываться отъ солнечныхъ лучей, почему и спятъ они ночью. Львамъ даютъ ѿспѣ одинъ разъ въ день по девяти или десяти фунтовъ мяса и пить по полуведру воды.

Общее было вѣкогда мнѣніе, что львы боятся пѣтушьяго крику; но

(*). Еѣ Парижскомъ звѣринцѣ львы начинаютъ „ревѣть при восхожденіи солнца, въ чмъ „подражаютъ имъ всѣ львицы; шакой ревѣ „продолжается минутъ десѧть. Наѣвшись, они „начинаютъ опять ревѣть, и по видимому „въ оба сіи раза ревѣ ихъ изображаетъ удо- „вольствіе, что они утолили свой голодъ, „или увидѣли дневной свѣтъ. Въ другое же „время они ревутъ рѣдко, какъ то: при „перемѣнѣ погоды, или когда долго не ви- „дятъ своего приспава.“

шеперь это оказалось совсѣмъ несправедливымъ.

На картина представлена львица съ тремя львенками, родившимися въ Парижскомъ звѣринцѣ. Она была беременна 108 дней. Львенки рождаются безъ гривы, которая у самцовъ начинается ростомъ въ концѣ третьяго или въ началѣ четвертаго года. У новорожденныхъ львенковъ нѣтъ также и ключка волосовъ, находящихся у взрослыхъ на концѣ хвоста. Шерсть на нихъ очень мягка, и не такого цвѣту, какъ у взрослыхъ. По сѣро-красноватому трунту примѣщено множество маленькихъ темныхъ полосокъ, особенно очень яркихъ на спинѣ и началѣ хвоста, и которыя лежатъ поперечно съ каждой стороны длинной и темной полосы, просматривающейся отъ затылка даже до конца хвоста.

Сей особый цвѣтъ шерсти на маленькихъ львенкахъ по мѣрѣ ихъ возрастания перемѣняется. Полоса, идущая вдоль спины вмѣстѣ съ полосками поперечными пропадаетъ, и пропорція

различныхъ частей ихъ тѣла прини-
мающъ болѣе сходства съ ихъ отцемъ
или матерью.

Аристотель и другие испытавши
природы думали, что львица въ
первой разѣ родила по шести львен-
ковъ, во второй разѣ по пяти, въ
третій разѣ по три, въ четвертой по
два, въ пятой по одному, и попомъ
переспала родить; но львица въ Па-
рижскомъ зоѣринцѣ доказала тому про-
тивное, ибо она рожала по два и по
три львенка, не слѣдя никакому по-
рядку.

E

F
N
D

B₂

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ,

издаваемыя

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

Optamus
Fumum de patriis . . . videre focis ,
Nescio , qua natale solum dulcedine captos
Ducit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.

МОСКА.

Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1817.


Печашашь позволяешся, съ предспаслѣ
ниемъ 5 экземпляровъ въ Цензурный Ко-
митетъ для казенныхъ мѣстъ. Москва.
Марша 22 дня, 1817. О. П., Надворный
Собѣтникъ и Кавалеръ Лейбъ Цеѣтасовъ.

изображения
и
описания
животныхъ
Российской имперіи.

№ 3.

РИМЛЯНОИ
СВЯТОГО ПАУЛА АПОЛЛОНА
ДЖИЛЕР ОБРАЩЕНИИ
К РИМЛЯНОМ

346





БѢЛЫЙ МЕДВѢДЬ.

Ursus Maritimus, albus, cauda abrupta,
capite colloque elongatis. LINN -
GMEL. *Syst. nat.* t. 1. p. 101. ДВИ-
ГУБСК. Кратк. опис. Россійск.
челв. животн. стр. 18.

Eisbär. BLUMENB. *Hand. d. Naturg.*

p. 94.

Ours blanc. BUFF. *Hist. nat.*

Polar bear. PENNANT *Quadr.* p. 192.
n. 139.

Обыкновенный медведь боится слиш-
комъ холодныхъ странъ, любитъ густыя лѣса умѣренного клима-
та, и рѣдко попадаєтъ на откры-
тыхъ мѣстахъ; бѣлый же медведь
есть животное самаго отдаленнаго,
мразнаго Сѣвера, и водится шоль-
ко по открытымъ безлѣснымъ берегамъ
Ледовитаго океана, по мысамъ его, на
островахъ и льдинахъ на поверхности
носимыхъ, и никогда отъ береговъ не-

то моря виширь земли далеко не заходиша.

Начиная отъ рѣки Оби въ Сибири, даже до рѣки Ковимы попадаюшися бѣлые медвѣди; въ большемъ же числѣ встречаются между устьями рѣкъ Лены и Енисея. Въ Бѣломъ морѣ нѣшь ихъ; ибо Новая Земля представляетъ выгоднейшее имѣ убѣжище.

Покойный Академикъ Палласъ первый сдѣлалъ вѣрное описание сего животнаго (*). Бѣлый медвѣдь похожъ на обыкновенаго медвѣдя, и имѣетъ длины отъ 3 до 4 аршинъ. Голова его больше, черепъ плосче и рыло толще, нежели у обыкновенаго медвѣдя, ноздри ширѣ, но зѣвъ рта уже, уши короче и круглѣе; усовъ почти нѣшь. Шея, по пропорціи тѣла, гораздо длиннѣе, хвостъ очень короткой, въ шерсти едва примѣшанный. Главный же отличительный признакъ бѣлаго медвѣдя отъ обыкновенныхъ медвѣдей (изъ которыхъ

(*) Палласа путешеснвіе по разнымъ мѣстамъ Россійскаго Государства Часп. III. половина. 2. спр. 349.

также попадающая шерстью бѣлыя) со-
стоитъ въ длину лапъ. Заднія лапы у на-
шего лѣснаго медвѣдя соспавляютъ едва
десятую часть всего тѣла, между тѣмъ
какъ у бѣлаго медвѣдя онъ равняющи-
ся шестой части всей длины его. Раз-
ность сїя происходитъ наиболѣе отъ
того, что обыкновенный медвѣдь не
всю лапою опирается о землю, какъ
Медвѣдь бѣлой. Шерсть на немъ нѣж-
нѣе и мягче, нежели на обыкновенномъ,
цвѣту бѣлаго серебристаго, съ малою
прожелѣзью. Конецъ рыла, края вѣкъ
и когти чернаго цвѣту, а губы синеваты.
Они ревутъ какъ и обыкновен-
ные медвѣди, или еще грубѣе.

Бѣлой медвѣдѣ имѣетъ обоняніе
лучшее, нежели зрѣніе. Онъ плаваетъ
хорошо, и ныряетъ въ воду. Походка
его медленна, но въ случаѣ нужды онъ
бѣгаешь проворно. Онъ поднимается ча-
сто на заднія лапы, и, опустивши го-
лову къ ногамъ, находился долго въ
шакомъ положеніи.

Бѣлой медвѣдѣ, можетъ быть, изъ всѣхъ млекопитающихъ животныхъ боится наиболѣе теплоты. Г. Палласъ упоминаетъ о медвѣдѣ, которой былъ у него въ Красноярскѣ, что онъ не могъ жить въ теплѣ, и любилъ очень часто валяться по снѣгу. На медвѣдя, котораго я видѣлъ 1804 году въ Парижскомъ зоѣриицѣ, ежедневно лѣпомъ и зимою выливали по нѣсколько ведеръ холодной воды, для его прохлажденія.

Бѣлые медвѣди питаются преимущественно животными водяными, какъ то рыбами, молодыми китами, прудами ихъ, и даже прупами другихъ медвѣдей. Они ловятъ также птицей, и нападаютъ иногда на моржей, когда сіи послѣдніе бываютъ на землѣ; но мясо животныхъ земныхъ не сполько имъ нравится. Они особенно бываютъ люты весною по выходѣ изъ своего зимняго логовища, ибо тогда бываютъ голодны, почему нападаютъ даже и на людей.

Бѣлыхъ медвѣдей, находившихся въ Парижскомъ звѣринцѣ, кормили хлѣбомъ, котораго они сѣдали по шести Фунтовъ въ день, и были очень жирны.

Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ бѣлые медвѣди ищущъ себѣ логовища на зиму, и довольствующіеся иногда какимъ нибудь ущеліемъ въ горѣ, или промежупкомъ между кучами льду. Они не пріуготавляютъ для себя поспели, но ложася на голую землю или ледѣ, покрываючися глубокимъ снѣгомъ, и въ совершенному безчувствіи лежатъ нѣсколько мѣсяцовъ. Самцы выходятъ изъ своихъ логовищъ при концѣ Марта мѣсяца, а самки въ Апрѣль. И хотя они чрезъ толь долгое время находятся совершенно безъ пищи но все еще бываючи довольно жирны. Въ сихъ зимнихъ логовищахъ самки рожаютъ, бывъ бременны около 7 мѣсяцовъ. Онѣ обыкновенно мечутъ по два медвѣженка, которые за матерью вездѣ ходятъ и кормящеся молокомъ ея до слѣдующей зимы. У молоденькихъ медвѣжонковъ

шерсть самая бѣлая и нѣжная, но съ
возрастомъ болѣе или менѣе желѣзистъ.


Бѣлыхъ медвѣдей бываютъ для цѣн-
ной ихъ шкурки, жиру и мяса, особли-
во на Новой Землѣ и Спицбергенѣ, куда
ѣдятъ множество охотниковъ, особ-
ливо изъ Архангельской Губерніи и дру-
гихъ приморскихъ мѣстъ. Когда же
вѣдь бросится на охотника, то сей,
увернувшись въ спорону, легко его по-
ражаетъ въ бокъ; но безъ сей уловки
трудно его убить, ибо онъ очень си-
ленъ, и сражается, стоя на заднихъ
лапахъ. По увѣренію охотниковъ, мож-
но испугать его легко огнестрѣльнымъ
оружиемъ и крикомъ многихъ людей.

Мясо бѣлыхъ медвѣдей єдятъ въ
нѣкоторыхъ мѣсахъ; а жиръ, ко-
раго изъ одного медвѣда вышапливаютъ
до двухъ пудъ, употребляется для
жженія, и онъ, по увѣренію, лучше ки-
шевато.



св
б.
и
да
об
ру
еа
й
по
ко
си
хъ
ож
имъ
въ
по
мъ
дъ
къ

Monodon Monoceros. L. Морской единорог.



ЕДИНОРОГЪ МОРСКІЙ.

Monodon monoceros. *LINN-GMEL*
Syst. nat. 1. p. 222. **ДВИГУБСК.**
Кратк. описан. всѣхъ животн.
четверон. Россійск. стр 94.
Ceratodon Monodon. *FISCHER Zo-*
ognos. V. III. p. 663.
See-Einhorn. *BLUMENB.* *Handb. d.*
Naturg. p.
Le Narval. *Tabl. encyclop. et method.*
Cetologie. p. 10.
Horned Narval. *KERR. Syst. Linn.* II.
p. 355.

Морской Единорогъ отличается
отъ всѣхъ животныхъ млекопитаю-
щихъ величиною, видомъ и мѣстомъ
своихъ зубовъ. Зубы сіи выходяще
изъ верхней челюсти, и прорѣзавши
верхнюю губу, торчашъ снаружи прямо.
Они бѣлы, очень тверды, хотя внутри
пусты, извины наподобіе винта, и
бывающъ длиною иногда въ 5 и 6 ар-
шинъ, толщиною къ корню почти въ

человѣческое плечо, но къ концу спаю за
вялся гораздо тонѣе. У взрослыхъ
единорогъ рѣдко бываетъ по двѣ
зуба, но большею частію по однѣ
му: ибо другой или случайно выпада
етъ, или во время ихъ сраже
нія съ другими животными, или отъ
удара о камень, или о другое какое
нибудь твердое тѣло переламывается.
Да и у молодыхъ животныхъ сего ро
да не вдругъ оба зуба выходятъ вонъ
какъ то *Блюменбахъ*, Гешингскій
Профессоръ, примѣтилъ въ маленькомъ
черепѣ молодаго единорога, хранящемъ
ся въ Лондонѣ въ одномъ собраніи естѣ
ственныхъ вещей (*). Кромѣ сего оди
ного зуба, иногда и двухъ, другихъ
зубовъ у него вовсе нѣтъ.

Голова сего животнаго мала, и едва
ее можно отличить отъ прочихъ ча
стей тѣла; на головномъ шлемѣ находит
ся одно дыхательное отверстіе, за
крывающееся требенчатою закрышкою.
Ротъ у единорога не великъ, гла

(*) *Blumenbach* Abbildungen naturhistorische
Gegenst nde n. 44.

за та же малы; слуховые скважины
небольшія. Туловище круглое, оваль-
но-продолговатое, голое; плечевые
ласпы (плавашельные перья) длинные,
а хвостовой плоскѣ раздѣленъ на двѣ
овальные шупыя части. На спинѣ, вмѣ-
сто спинного ласта, находящіяся неболь-
шое узенькое возвышеніе, идущее отъ го-
ловы до хвоста. Кожа на единорогѣ из-
сѣра-блѣлая, испещренная множествомъ
темныхъ пятенъ, брюхо же совершенно
блѣлое и лоснающееся (*).

Единороги водятся собственно око-
ло Гренландіи въ Сѣверномъ океанѣ, но
припливающіе также къ Новой Землѣ и
къ Мезенскимъ по Восточную сторону
Канинскаго носа берегамъ. Пишаются
различными морскими произведеніями, а
особливо живописными черепокожными.
Дѣшѣй родятъ живыхъ и кормятъ ихъ
молокомъ. Единороги плаваютъ спада-
ми. Они бывающіе длиною аршинъ въ
10 и болѣе, а толщиною около 6 ар-

(*) Около Новой Земли и у Мезенскихъ береговъ попадающіе единороги совсѣмъ черные. Путешествія Академика Лепекина Ч. IV. стр. 369.

шинъ. Бываютъ сихъ животныхъ въ болѣшомъ количествѣ тогда только, когда онъ собираются для дыханія къ отдушинамъ, находящимся на льду; ибо безъ воздуха подъ водой долго быть не могутъ. При сихъ отдушинахъ собирается ихъ такое множество, что здѣсь принуждены бывають клади свои зубы на спины переднихъ, и въ такомъ состояніи не могутъ ни опускаться на дно моря, ни уходить отъ промышленниковъ, ихъ преслѣдующихъ копорые въ сїе время удобно колючими заднихъ; по одинаркѣ же ихъ бить и открытомъ морѣ очень трудно и опасно; ибо онъ плаваютъ съ чрезвычайною быстротою, и своими зубами могутъ причинить большой вредъ.

Хотя промышленники не спользуютъ получающими ворванного сала отъ едкихъ ворога сколько отъ киша, но сало едятъ починающее лучшимъ кишеваго. Ворочемъ Россійские промышленники малыми занимаются симъ промысломъ (*).

(*) Описаніе Архангельской Губерніи Молчановъ Слб. 1815. стр. 222.

У Гренландцоў всѣ часши сего живошнаго идуішъ вѣ дѣло, ибо они мясо его употребляюшъ вѣ пищу, какъ вареное таќъ и копченое, сало для своего освѣщенія; изъ кишокъ его дѣлаюшъ пузыри, употребляемые ими при рыбной ловлѣ. Сухія жилы доспавляюшъ имъ превосходныя нитки и веретки, а кости ихъ употребляюшъ вместо кольевъ при строеніи своихъ шалашей; изъ зубовъ выдѣлываюшъ различныя орудія для охоты.

Зубы сіи, не уступающіе бѣлизною слоновыимъ, бываюшъ тяжелы ихъ, плошнѣе, и не желѣзьюшъ никогда. По словамъ Г. Бонастерре, у Дашскаго Короля есть великолѣпный тронъ, сдѣланый изъ сихъ зубовъ, кошорой цѣняющъ дороже золота, еслибы такої же тронъ былъ сдѣланъ изъ сего мешалла (*).

Вѣ прежнія времена, когда зубы сіи почитаемы были Рогомъ неизвѣстнаго живопнаго чешвероногаго, кошораго на-

(*) Tableau encyclopédique et methodique des trois r gnes de la nature. Cetologie par Abb  Bonaterre. 1789. p. 10.

зывали единорогомъ но копораго дѣй-
ствительно никогда не бывало , при-
писывали зубамъ симъ разныя врачеб-
ныя силы, и продавали ихъ чрезвычай-
ко дорого. Такъ напримѣръ, Царю Алекс-
ѣю Михайловичу бывшій при немъ
Докторъ Белау предлагалъ купиши два
такие зуба подѣ именемъ инроговыхъ
(единороговыхъ) роговъ, копорыхъ при-
сыланы были изображенія съ шаковымъ
пришомъ мнѣніемъ, что они пригодны
стоять напереди его Кесарскаго пре-
стола, а цѣна имъ 8000 рублей (*); дру-
гой же кусокъ рогу, вѣсомъ около прѣвѣ-
унцій, какъ полезной отъ многихъ бо-
лѣзней, предлагалъ купиши за полсорока
соболей; и его Государь согласился ку-
пиши , и послалъ сорокъ соболей са-
мыхъ добрыхъ (**). Сверхъ сего тошъ
же Докторъ Белау предлагалъ Царю
Алексѣю Михайловичу шакой же зубъ,
пригодной по его мнѣнію для Царска-


(*) Geschichte der Medicin in Russland von W.
M. v. Hichter. Moscow 1815. 8. Theil. II. Bei-
lagen. p. 55.


(**) Тамъ же.

го посоха, за 1000 червонныхъ золо-
щыхъ, копорые можно уплатить со-
болями; на чио Государь шакже согла-
сился и велѣлъ послать десять сороковъ
соболей добрыхъ по Сибирской цѣнѣ на
1000 рублей серебромъ (*).



(*) Тамъ же спп. 57.







Columba turtur. L.

Голубь

Г О Р Л И Ц А.

Columba turtur, rectricibus apice albis,
dorso griseo, pectore incarnato, macula
lateralis colli nigra, lineolis albis.

LINN-GMEL *syst. nat. t. 1. p. 786.*

Turteltaube. *BECHSTEIN Ornithol.*

Taschenb. 1. p. 232.

La Tourterelle des bois. *BUFF. Hist.*

nat. des ois. II. p. 550.

Common Turtle. *LATH. Syn. II. p.*

644. n. 40.

Горлицы находять по всему земному шару, но въ странахъ холодныхъ гораздо въ меньшемъ числѣ, нежели въ странахъ теплыхъ. Въ Южной и Умеренной Россіи, и даже въ теплыхъ мѣстахъ Сибири, гдѣ только есть большие лѣса, тамъ есть и горлицы; попадаются они и въ лѣсахъ Сѣверной Россіи, но не живущѣ болѣе прѣвѣтствій. Въ разныя мѣста Россіи прилетающіе горлицы не въ одинакое время,

и при наступлении осени опять оплетаютъ, для чего обыкновенно собираются большими спаями. Во время краткаго ихъ пребыванія въ нашихъ странахъ, онѣ понимаються, вынося гнѣзда, несущъ лица и выводяще дѣтей, которыя подросши, улетаютъ вмѣстѣ со старыми.

Кажется, что не столько холода, сколько пища, состоящая въ сѣменахъ и ягодахъ распѣній, заставляетъ ихъ удаляться на зиму въ теплые мѣста.

Горлица величиною съ дикаго голубя, на котораго она нѣсколько и походитъ. Клювъ у ней тонкой, темноватой, а на внутренней сторонѣ красноватъ; ноги совсѣмъ красны; грудь и глотка красноватыя, а спина покрыта смѣстью синеватыхъ и сѣрыхъ перьевъ, брюхо кажется белесовато. Большая перья крыльевъ темнокрасны, а среднія пепельного цвѣту; хвостовые перья на концѣ белыя, по бокамъ шеи примѣтно продолговатое черное пятно, съ поперечными белыми же полосками. Крылья у самки имѣютъ пятна, имѣющія

Цвѣтъ ржавчины Молодыя горлицы до времени первого ливня носятъ цвѣтъ изъ красна - сѣроватой, и на крыльяхъ шемносѣрыя пятна.

Горлицы изъ давнихъ временъ были въ почитеніи у многихъ народовъ. Евреи должны были некогда преимущественно горлицѣ приносить на жертву. Спихотворцы всѣхъ временъ и народовъ прославляли и прославляютъ въ своихъ стихахъ нѣжную любовь горлицѣ, и ихъ примѣрную супружескую верность. Да и въ самомъ дѣлѣ, никакая другія птицы не показываютъ столько прогадельной нѣжности, и не представляютъ столь многихъ промы доказательствъ, состоящихъ въ разнообразныхъ ласкахъ. Какъ скоро самецъ найдетъ себѣ подругу, то начинаетъ сперва какъ бы кланяться ей, и сіе дѣлаетъ очень скоро, и при всякомъ разѣ присѣдая, носомъ своимъ касаешься земли или вѣнца, на которой сидишь; за сими поклонами слѣдуютъ шумные, прерывные воркованья и нѣжные вдохи.


Сии спрасные любовники изъясняющъ любовь свою подружкамъ голо-
сомъ прерывистымъ тонкимъ, и въ положеніи униженномъ, какъ бы про-
сящъ ихъ не быть къ нимъ суровыми.
Самка, казавшаяся сперва нечувстви-
тельною, мало по малу преклоняется
и внутреннее движение свое обнаружи-
ваетъ нѣжнымъ воркованіемъ и жалоб-
нымъ пронзительнымъ голосомъ,
рываяющимся изъ нея какъ бы пропивші-
воли; наконецъ начинаетъ оказывать
свои ласки сперва робкими поцѣлуями,
которые часъ отъ часу становятся
чаще и горячѣе. Съ сего времени
самка не оставляетъ уже самца, пога-
чувство гораздо сильнѣйшее не зо-
спавивъ ее раздѣлять время между
любовью и воскормленіемъ птенцовъ
своихъ. Епрочемъ сполько прославле-
емая спихотворцами рѣдкая вѣрность
сихъ птицъ, которая, по свидѣтель-
ству даже извѣсныхъ испытателей
природы, проспираетъ до того, что
будто оставшиеся самцы по смерти
своихъ подружекъ, или самки лишив-


шіяся самцовъ, спонутъ безпрестанно, и не думають о вспущеніи въ новыя свизи, весьма сомнительна; ибо неоднократно примѣчено, что самцы, разлученные съ самками, понимающіе съ другими, и даже не съ горлицами, но голубками.

Горлица вьетъ гнѣздо на деревьяхъ и высокихъ кустарникахъ, кладетъ по два бѣлыхъ яица, рѣдко по три, на которыхъ поперемѣнно сидятъ и самка и самецъ, что продолжается 20 или 21 день. Самецъ заботится также вмѣстѣ съ самкою и о кормѣ дѣшей до тѣхъ поръ, пока онъ придумѣтъ въ состояніе лепашь.

Голосъ горлицы есть спенаніе, подобное воркованію голубей, только гораздо сильнѣе. Мясо горлицы нѣжнѣе голубинаго, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ употребляется въ пищу. Ловятъ ихъ силками и спрѣляютъ изъ ружей.









Squalus glaucus. L. *Axynia cutes.*

А К К У Л А С И Н Я Я.

Squalus glaucus, caudae lateribus laevibus, fonsula ad extremum dorsum finem. LINN-GMEL. *Syst. nat.* t. I. p. 1496.

Elauer Hay. *BLOCH. Hist. nat. des poiss. par CASTEL* t. VIII. p. 220.

Le cagnot glauque. *BLOCH ibid.* p. 217.

Blew shark. *PENN. Brit. Zool.* III. p. 84.

Опличищельный признакъ сей породы отъ другихъ аккуль соспоишъ въ томъ, что у нее близъ глазъ нѣшъ особыхъ отверстій, какія примѣшны у всѣхъ эногого рода рыбъ.

Голова сей аккулы нѣсколько плоская; рыло длинное, глаза маленькие, желтоватые. Ротъ широкой, зубы почти треугольные, острые, въ верхней челюсти зазубренные, а въ нижней гладкие. Зубы сіи не

рѣдко попадаються окаменѣлыми въ зем-
лѣ, подъ ложнымъ названіемъ *окаменѣ-
лый языковъ* (*Glossoptera*), какою
находяще и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
России. Туловище ея круглое, и не-
сколько шероховатое. На шеѣ примѣщ-
но пять продолговатыхъ въ видѣ ду-
ги дыхательныхъ опровергній. Плава-
тельныхъ перьевъ на спинѣ два, оба
безъ колючихъ косточекъ, изъ кошо-
рыхъ первое, почти треугольное, нахо-
дится между перьями грудными и
брюшными, а другое надъ самымъ
краснымъ перомъ. Грудная плаватель-
ная перья длинныя, хвостовое перо
съ выемкою; не далеко отъ сего пера
есть на спинѣ маленькое треугольное
углубленіе.


Вся сія рыба сверху одѣта прекрас-
нымъ синимъ цвѣтомъ; такой же
цвѣтъ имѣютъ и всѣ плавательные
перья, выключая брюшное перо, у кошо-
раго конецъ белъ, и перо красное со-
вершенно белое.


Синяя аккула величиною бываетъ
болѣе аршина, а толщиною иногда око-

ло полуаршина. Она водится кромъ дру-
гихъ морей и въ морѣ Балтійскомъ.

Аккула принадлежитъ къ числу
хищныхъ рыбъ, и пишется другими ры-
бами. Мясо ея жестко и дурно, почему
и ловятъ ее только для печенки, ко-
торая, будучи хорошо приготовлена,
составляетъ весьма вкусную пищу.









Aptenodytes chrysocoma. L. Єшчекрвінка хар

* * * * *

ЧЕШУЕКРЫЛКА ХОХЛАТАЯ.

Aptenodytes Chrysocome, rostro rufo-fusco, pedibus flavescentibus, crista frontali atra erecta, auriculari deflexa sulphurea LINN-GMEL. *Syst. nat.* t. I. p. 555.

Der gehaubte Penguin. *Bilderb. f. d.*

Kind. par Berluch B. I. n. 3.

Manchot fauter. *BUFFON hist. nat. des ois.* t. IX. p. 409.

Crested Pingvin *LATH. Syn. III.* p. 56.

* * * * *

Птицы сии, удивительные по строению своих крыльев и ног, во-
дящиеся только около островов Южного
моря, и большую часть жизни, со-
образно строению своего тела, про-
водящим на открытом море, где они
собираются небольшими стаями (по
12 и более), всегда в далеком отдале-
нии от берегов, к которым при-

плывающъ только во время пониманія своего, и когда кладутъ лица. Въ сіе время выходяще онъ на землю въ столь великомъ множествѣ, что иногда убивающъ ихъ въ короткое время до 5000.

По причинѣ короткихъ своихъ ногъ, выходящихъ близъ самаго почти хвоста, птицы сіи принуждены держать себя на землѣ не въ горизонтальномъ, но въ перпендикулярномъ положеніи, такъ что Англичанинъ *Нарборугъ* (*) сравнилъ ихъ съ маленькою шолпою дѣтей, имѣющихъ белые фаршуки.

Особливо же удивительны ихъ крылья; онъ вовсе не имѣющъ длинныхъ перьевъ, но усажены маленькими жирными перышками, густо сидящими, и похожими болѣе на чешуйки; а потому и самыя крылья болѣе походяще на плавашельные перья некоихъ рыбъ.

При паковыхъ крыльяхъ сіи птицы не могутъ вовсе лепашь.


*) *Blumenbach Abbildungen naturhistor. Gesetz*
stand. n. 46.

Представленная здѣсь порода дѣлаетъ
большіе по водѣ скачки.

Хохлатая чешуекрылка водится
около Фалклендскихъ острововъ и
около Южной части Новой Голландіи.
Она вышиною около аршина; кловъ
у ней шемнокоричневый; на головѣ
хорохъ одинъ споячій черный, а дру-
гой висячій по споронамъ головы, сѣр-
ваго цвѣту; пѣло сверху черно-синее,
а снизу бѣлое; крылья сверху черныя,
снизу бѣлые; ноги изкрасна желто-
вашая, и пальцы всѣ обращены впередъ.

Самки не дѣлаютъ гнѣздъ, но кла-
дущъ по одному бѣлому яицу въ ямку,
вырытую въ землѣ, между гнѣздаами
пеликановъ.





ИМЕНА ОСОБЪ ПОДПИСАВШИХСЯ НА
СIE ИЗДАНIE, СЪ КАРТИНКАМИ РАС-
КРАШЕННЫМИ, ПО ПОРЯДКУ, КОГДА
КТО ПОДПИСАЛСЯ.

Въ Орлѣ. Его Сіятельство Графъ
Сергій Михайловичъ Каменскій.

Въ Санктпетербургѣ. Его Высокопре-
восходищельство Дмитрій Прокофіевичъ
Трощинскій.

Въ Москвѣ. Его Высокородіе Лукъ-
янъ Яковлевичъ Яковлевъ.

Въ Калугѣ. Капитанъ Еа-
саковъ.

Въ Болховѣ. Коллежскій Ассесоръ.
Карповъ.

Въ Москвѣ. Университетскій Благо-
родный Пансіонъ.

Въ Орлѣ. Губернская Орловская Гим-
назія.

Въ Москве. Его Превосходительство
Иванъ Васильевичъ Черниковъ.

Въ Вязьмѣ. Николай Григорьевичъ Ма-
слениковъ.

Въ Торжкѣ. Купеческій сынъ Пётръ
Баранниковъ.

Въ Вильнѣ. Его Превосходительство
Андрей Ивановичъ Бухарскій.

— Маю́ръ Соловьевъ.

Въ Серпуховѣ. Капитанъ Масаловъ.

Въ Мосальскѣ. Купецъ Матвѣй Куз-
мичъ Алтуховъ.

Въ Дмитровскѣ. Г. Морозовъ.

На Абрамовской станціи. Напалъя
Алексѣевна Новосильцова.

Въ Меленкахѣ. Надворный Совѣт-
никъ Мальцовъ.

Въ Сибирскѣ. Иванъ Степановичъ
Кромковъ.

Въ Краснослободскѣ. Купецъ Иванъ
Савостьяновъ.

Въ Покровѣ. Надворный Совѣтникъ . . .
Бешкѣевъ.

Въ Сергачѣ. Типулярный Совѣтникъ . . .
Петелинъ.

Въ Задонскѣ. Надворный Совѣтникъ . . .
Бехшѣевъ.

Въ Сапожкѣ. Корнетъ Бушаловскій.

Въ Рязани. Генераль-Инженеръ . . .
Кильзевъ.

— Г. Типулярный Совѣтникъ . . .
Форшинскій.

Въ Зарайскѣ. Еригадиръ . . . Аничковъ.

Въ Костромѣ. Надворный Совѣтникъ . . .
Маковѣевъ.

Во Владилѣпѣ. Директоръ училищъ
Дмитрій Ивановичъ Дмитревскій.



H

F

Fu

Ne

Du

Bz

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
издаваемыя
ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

Optamus
Futum de patriis videre focus ,
Nescio , qua natale solum dulcedine captos
Dicit

OVID. Epist. III. ex Ponto 34—36.


МОСКА.
Въ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.
1817.


Печатать позволяется, съ представле-
ніемъ 5 экземпляровъ въ Цензурный Ко-
митетъ для казенныхъ мѣстъ. Москва,
Мая 11 дня, 1817. О. П., Надворный
Совѣтникъ и Кавалеръ Левъ Цвѣтаевъ.

ИЗОБРАЖЕНИЯ
и
ОПИСАНИЯ
ЖИВОТНЫХЪ
Российской империи.



Nº 4.







Capra Aegagrus. L. дикоў ко

ДИКОЙ КОЗЕЛЬ.

Capra Aegagrus, cornibus carinatis,
gula barbata. LINN-GMEL. *Syst. nat.*
t. 1. p. 193. ДВИГУБСК. Кратк.
описан. всѣхъ животн. четверон.
Россійск. стр. 73.

Aries Aegagrus, cornibus arcuatis com-
pressis, rugofis, dorso carinatis. FI-
SCHER *Zoognos. Vol III. p. 385.*

Bezoar-Bock. *Georgi geographisch. phy-
sical. und naturhist. Beschreib. d.
Rus. Reichs t. III p. 1618.*

Le paseng, ou bouc sauvage. *La Mena-
gerie du Museum national d'histoire
naturelle p. 177.*

Wild goat. KERR *Linn. syst. p. 328.*

Всѣ породы козловъ, какъ наруж-
нимъ видомъ, такъ равно своимъ
качествами и образомъ жизни сходны
между собою. Всѣ сіи животныя любятъ
высокія горы, питаются расщѣніями и
древесною корою; они рѣзы, своеобраз-

мы и бодливы. Голова у нихъ продолговатая, уши острывя; шуловище короткое, ноги о двухъ копытахъ, хвостъ маленькой. При шаковомъ ихъ сходство между собою, различать однѣ породы отъ другихъ чрезвычайно трудно. Одни только рога ихъ доспавляютъ доспашечные признаки для распознаванія однихъ отъ другихъ. Описываемые здѣсь козелъ и коза весьма похожи на нашихъ домашнихъ козловъ и козъ; они опровергаютъ совершенно мнѣніе Г. Палласа, что наши домашнія козы происходяшь отъ сихъ же животныхъ.

Дикой козелъ немного побольше домашняго козла, но крѣпче его и сильнѣе. Шерсть на немъ гладкая, и жопя довольно длинна, но не висячая, жромъ бороды.

Намъ извѣсны три породы козловъ: козель камениный, иначе каменинымъ бараномъ называемый (*Capra ibex Lin.*); туръ (*Capra Caucasica*) и настоящій дикий козель (*Capra ae-*

gagrus), у копораго рога загнуты дугою и съ боковъ сплющены, отъ чего передняя ихъ сторона довольно остра, а задняя округлена; сверхъ того на нихъ примѣтны во всю почву ихъ длину поперечные кольца, какъ у нашихъ домашнихъ козловъ. Сими рогами отличается онъ какъ отъ *кленного барана*, у копораго рога почви четырехсторонне съ весьма примѣтными на верхней поверхности шишками, такъ и отъ *турса*, у кошораго рога треугольные, а верхній уголъ шупой. Шерсть на дикихъ козлахъ обыкновенно изсѣра красновата; но бывающій козлы шемные и рыжеватые. Впрочемъ у всѣхъ, какого бы они цвѣту ни были, передняя часть морды, широкая полоса, идущая вдоль спины отъ запылька къ хвосту, другая, идущая отъ спины по плечамъ, а иногда и полоса, идущая по заднимъ ногамъ, также борода, полоса на шеѣ, грудь и часТЬ брюха, все шемяще прочей шерсти. Хвостъ черного цвѣту, а задъ бѣловатъ.

Козелъ сей водится по горамъ Кавказскимъ, но въ маломъ количествѣ. Сей-то козелъ доставляется Восточнымъ жителемъ *Бецоаръ*, или такъ называемый пропивуядный камень, бывшій нѣкогда въ большомъ уваженіи у самыхъ Европейцевъ.

Бецоаръ сей не чѣо иное есть, какъ очень твердой сростокъ въ видѣ камешковъ, находимый въ желудкѣ сихъ козъ; впрочемъ таковые же сростки находяться въ желудкахъ и кишкахъ премногихъ другихъ животныхъ, но *бецоаръ* дикихъ козъ предпочитається всѣмъ другимъ. Онъ находится не во всѣхъ козлахъ и козахъ. Въ желудкахъ козловъ чаще бываетъ нежели у козъ и чаще у спарыхъ нежели у молодыхъ (*). Настоящій *бецоаръ* синеватъ или зеленоватъ, запахъ имѣетъ крѣпкой, но пріятной; и, по словамъ Г. Гмелина, который имѣлъ случай въ Персіи видѣть настоящее *бецоары*, дѣйствительно можно подумать, что

(*) Гмелина путешествіе по Россіи часть III.
доловина впорахъ, стр. 718.

въ нихъ много содержится силы тѣхъ распѣній, которыми животная сія питаются. Во время бытия спи и Гмелина въ Персіи, все еще бѣзоаръ въ сихъ спранахъ былъ въ великомъ уваженіи. Г. Гмелинъ (*) утверждаетъ, что настоящій бѣзоаръ, судя по его сильному и проницательному запаху, долженъ имѣть какія-нибудь дѣйствительные полезныя качествы, и что онъ въ Азіи и теперь употребляется съ пользою, какъ надежное пропивуядное лѣкарство; въ Европѣ же потерялъ свою цену отъ множества поддельныхъ бѣзоаровъ, или получаемыхъ изъ другихъ животныхъ, которыя имѣютъ совсѣмъ другія свойства, и которыя привозимы были въ Европу и продаваемы за бѣзоаръ настоящій, между тѣмъ какъ сей послѣдній и въ Азіи очень рѣдокъ и дорогъ; да и самые подложные бѣзоары продаются не дешево. Настоящій бѣзоаръ узнается по тому, что если потерешь имъ руку, насыпавъ

(*) Тамъ же спр. 719.

сперга на нее золы, шо на рукъ оспа-
нусся желтая пяпна (*).

Дикие козлы избираютъ для жи-
лища своего ущесиспяя на горахъ воз-
вышенія, и живутъ спадами. Они
весьма боязливы, бѣгаютъ очень ско-
ро и безопасно по краямъ страшныхъ
пропастей; для чего природа ноги
ихъ устроила такъ, что они могутъ
двигаться во всѣ стороны; а при
шомъ переднія ноги короче заднихъ, и
поэтому они могутъ взбираться легко
на самыя крушныя горы.


У самни, представлennой на вто-
рой картины вмѣстъ съ козленкомъ,
родившимся въ Парижскомъ звѣринцѣ,
рога гораздо меныше; впрочемъ цвѣтъ
шерсти такой же какъ и у самцовъ.
Самки рождаются по одному и по два
козленка.



(*) Гмелинъ пишетъ же спир. 720.



Коха со Козленкомъ







Ardea Antigone. L. Журавль сорочий

ГОЛОШЕЙНОЙ ЖУРАВЛЬ.

Ardea Antigone, capite nudo collari-
que papilloso rubris, corpore cinereo,
remigibus primoribus nigris. LINN-
GMEL. *syst. nat.* t. I. p. 622.

Indianischer Kranichreiher. GEORGI
*geographisch - physicalische und na-
turhistorische Beschreibung des Rus-
sischen Reichs* t. III. p. 1774.

Grue à collier. BUFF. *hist. nat des ois.*
t. VIII p. 305.

Indian Crane. LATHAM *Syn.* III.
p. 38.


Сей красивой журавль, по свидѣ-
тельству Г. Георги, залетаешь и ног-
да въ Даурію, и вспрѣчаешься по спе-
циальнѣ около Байкала, хотя наспо-
щее ощечество его есть Индія.


Онъ бываетъ вышиною почти въ
два аршина, носъ у него прямой,
острой, длинище головы и нѣсколько
сжатой, цвѣту желто-зеленаго. Ноz-

дри узкія, отъ коихъ идетъ бороздка, простирающаяся почти до конца носа, языкъ острой, глаза красноватые. Шея длинная, и до половины голая, усажена бородавками. На головѣ мѣлкой пухѣ вмѣсто перьевъ; передняя часть ея бѣловата, а задняя и вся часть шеи бородавчатая; онѣ красноваты; прочее тулowiще свѣтлосѣраго цвѣту, крылья также сѣрыя, выключая первыхъ большихъ перьевъ, которыхъ имѣютъ черной цвѣтъ; хвостъ сѣрой. Ноги длинныя четырепалыя, цвѣтомъ красныя; но попадаються журавли и сѣ ногами черными, или темными. Журавли сушь перелепныя пищи, и потому не удивительно находишь ихъ иногда въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они совсѣмъ не живущі и не плодятся.

Они пишаются болѣею частію лягушками, ящерицами и насѣкомыми; гнѣзда вьютъ въ проспникахъ, гдѣ и выводятъ по два журавленка. Степные народы употребляютъ мясо ихъ въ пищу.







САРАНЧА.

Gryllus migratorius, thorace subcarinato:
segmento unico, capite obtuso, maxillis atris. LINN-GMEL. Syst nat.
t. I. p. 2075.

Zug-Heuschrecke. GEORGI geographisch-physicalische und naturhist.
Beschreib. d. Russ. Reichs. Vol. III,
p. 2057.

Grillon voyager. Faune Parisienne par
WALKENAER. t. I. p. 286.

Насекомое сие, мало известное
в странахъ холодныхъ, водится въ
Южной и Юговосточной Россіи въ спе-
циахъ, и по временамъ причиняетъ
ужасные опускания въ поляхъ, са-
дахъ и лѣсахъ.

Южная мѣста Россіи, какъ то
Губерніи: Таврическая, Херсонская, Ека-
теринославская, Подольская, Волын-
ская, Киевская, Черниговская, Укра-
инская, Полтавская, и даже Кур-

ская, также Кавказская, Астраханская, Саратовская, Грузия, земля Донскихъ козаковъ и нѣкоторыя мѣста Юго-восточной Сибири бывающъ иногда подвержены ужаснѣйшему нападенію саранчи.

Бывающъ годы, въ которые саранча, особенно въ Іюль и Августъ, появляется въ такомъ множествѣ, что въ короткое время опустошаешь совершенно сѣнокосы, поля засѣянныя хлѣбомъ, сады и лѣса; и сіи опустошенія тѣмъ бывающъ тягостнѣе, чѣмъ этопѣ гадъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ появляется сряду года два, три и чешыре. Но таковыя нещастія случаються рѣдко; а замѣчено, что саранча появляется во множествѣ чрезъ 15 и ²⁰ лѣтъ. Сильные вѣпры пригоняютъ иногда въ Россійскія Губерніи безчисленныя стада саранчи изъ степей Турецкихъ и Ташарскихъ, котораа въ нѣсколько часовъ пожираетъ пшеницу, хлѣбъ, огородныя овощи, древесные листья; и когда земля осипанѣй обнаженною, а деревья лишенными

лишьевъ, шогда саранча перепалзы-
ваетъ и перелешаєтъ далъе. Случає-
ся иногда и то, что она, испре-
бивши гдѣ-нибудь все распущее и, по
причинѣ дурной погоды, не имѣя воз-
можности летѣть далъе, начинаетъ
пожираТЬ другъ друга (*).

Саранча можешьъ также и пере-
плывашъ рѣки съ одного берега на дру-
гой, сѣдѣлясь для того больши-
ми клубами; однако же при такой пе-
реправѣ много ея погибаешьъ.

Саранча бываешьъ иногда величиною
вершка въ два, но обыкновенная величи-
на шѣла ея полшора вершка. Голова у
ней большая, шупая, нагнувшаяся внизъ,
съ крѣпкими зубчатыми челюстями.
Усики на головѣ нишебразные. Зеленої
грудной щитокъ имѣешьъ посерединѣ
башре возвышеніе; крыльевъ чешыре,

(*) Всѣ породы *кузнечиковъ*, къ которымъ
принадлежитъ и *саранча*, суть животныя,
принадлежащія одними только различіями, по-
чему заслуживаетъ особенное вниманіе естест-
ства испытателей и то вѣйшее излѣдо-
ваніе то, что написано въ *посердностныхъ*
запискахъ отъ *Москвы* въ *Малороссію*,

верхнія желто-сърыя съ бурыми раз-
ныхъ фігуръ пятыми (*), а испод-
нія зеленыя; спина и бока синія, а
брюхо и ноги съисподи красныя; зад.

1805 года, изданныхъ Г. Гуномъ. Въ сихъ
запискахъ часп. II. стр. 75 сказано: „есть:
„примѣры, что саранча пожирала даже и
„одежду; и часп. III. стр. 11. „Неподалеку“
„отъ города Лубны сожрала саранча
„девухъ дѣтей, изъ коихъ одному было два,
„а другому одинъ годъ. Сии нещастныя
„дѣти спали близъ дороги, и когда отецъ
„и мать иѣ, занимавшися тутъ же ра-
„ботою, увидѣли нашествіе сего губи-
„тельнаго воинства, то побѣжали далѣ
„въ поле, чтобы спасти хотя что-ни-
„будь изъ посѣяннаго ими; по возвраще-
„ніи своемъ нашли они превеликую ну“
„чу саранчи на нихъ, а подѣ нею однѣ
„только ихъ кости (?)“

(*) Суевѣрные невѣжды, а иногда и обман-
щики въ пятнахъ сихъ находашъ нѣкоторое
сходство съ буквами, и каждой на своемъ
языкѣ думаютъ читать на крыльяхъ саранчи
писмена, начерпанныя разг҃иваннымъ Богомъ и
возвѣщающія наказаніе народамъ. Я очень
помню, какъ одинъ сумасбродъ въ Харьковѣ
(лѣтъ шому около тридцати) носилъ съ
собою множество таковыхъ крыльевъ, по-
казывалъ ихъ проспакамъ, заставлялъ чи-
тать, и какъ напурально никто не могъ
прочитать, то онъ самъ читалъ и предвидалъ
на будущій годъ постопъ. О таковыхъ же про-
рокахъ упоминаютъ и иностранные писатели.

нія ноги у ней очень длинны, посредствомъ копорыхъ она прыгаєтъ весьма далеко. Большия крылья способствують ей къ быстрому лепанью, почему на лепу и не скоро ее поймать можно; сверхъ того она и видитъ очень хорошо.

Саранча понимается въ Августѣ и въ Сентябрѣ. Самцы сзывающъ самокъ, производя далеко слышной шумъ посредствомъ своихъ ногъ. Самки кладутъ яица въ землю, сдѣлавъ въ оной довольно глубокую ямку заднею часпію своего тѣла, или кладутъ ихъ на спебли распѣній и корни ихъ, на камни и проч.; въ рѣшакомъ случаѣ покрываютъ ихъ рѣдомъ нѣкоторой пѣнистой жидкости, исходящей изъ нихъ, чрезъ что яица хорошо бывають защищены отъ сырости и холода. Каждая самка кладетъ яицъ отъ 70 до 90 и болѣе, а потомъ пропадаетъ. Если въ此刻и погода будетъ дурная, ненастная, а зима очень холодная, то не смотря на это, что безчисленное множество

было положено яицъ, весною не появляется сполько саранчи, сколько было въ прошломъ году. Но когда осень теплая и сухая, зима нехолодная, и весна случится теплая, то маленькая саранча выходитъ изъ яицъ въ началѣ весны, и распеть очень скоро. Она, подобно всемъ полужестокрылымъ насѣкомымъ, не превращается ни въ гусеницу, ни въ куколку, но сполько перемѣняется нѣсколько разъ свою кожу. Такимъ образомъ по выходѣ изъ яица она имѣетъ уже видъ настоящей саранчи, только безъ крыльевъ, попомъ появляются крылья, посредствомъ шорыхъ, перемѣнивши кожу въ чешуевстой разъ, она начинаетъ лепашь; а до тѣхъ поръ перепалзываетъ съ одного мѣста на другое, и пожираетъ все, что ни распеть въ полѣ.

Саранча лепашь обыкновенно предъ заходенiemъ сполько солнца, а днемъ прыгаestъ. Она лепашь на высоко отъ земли, сажени въ двѣ или слишкомъ, а рѣдко выше древесныхъ вершинъ. Въ полешь своимъ верхними

крыльями производиша сильной шумъ. Изъ Польскихъ записокъ видно, чиша саранча въ Губерніяхъ Подольской и Волынской въ 1534 году занимала пространство въ длину ширеъ Польскихъ миль; въ 1527 году прилѣпала шуда изъ Турціи; въ 1536 году отъ спорны Чернаго моря; въ 1542 году изъ Турціи; 1708 году изъ Валлахіи, 1748 году изъ Турціи. Въ семъ году она распространилась по всей Венгріи, Польшъ, Силезіи и даже была въ Англіи.

Полетъ ея вообще много зависитъ отъ направленія вѣтровъ. Саранча прилетаетъ иногда въ шакомъ чрезвычайномъ множествѣ, что занимая пространство на 3 и 4 версты въ длину и на столько же въ ширину, состоящемъ спольше толстое, шакъ сказашъ, облако, что въ томъ мѣстѣ и солнца не бываетъ видно.

Чрезвычайный вредъ, причиняемый саранчею, побуждаєть поселенія испрѣбляти ее всякимъ образомъ и во

всѣхъ ея состояніяхъ. Такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ собираютъ ея лица и испрѣбляютъ ихъ, перека-
пывая и перепахивая нѣсколько разъ землю.

Весною, когда она еще не можетъ лепать, роютъ въ разныхъ мѣстахъ небольшіе рвы, и мешлами, вѣника-
ми и проч., дѣлая припомъ большой шумъ и крикъ, загоняютъ ее въ ямы,
гдѣ убиваютъ и землею засыпаютъ. По степямъ, когда весною выжигаютъ ихъ, пропадаетъ очень много саранчи.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по такимъ полямъ, гдѣ есть саранча, гоняютъ овецъ, коровъ и лошадей, которыя во множествѣ ее подавляютъ. Когда же саранча получитъ крылья, и начнетъ предпринимать часто весьма далекія путешесствія, то чтобы ее не допу-
стишь гдѣ-либо опуститься на поле, собираются люди въ великомъ множе-
ствѣ, производятъ большой шумъ, спу-
ча разными вещами, звоня въ коло-
кола, стрѣляя изъ ружей, разводя въ полѣ огонь и проч. Но когда уже она

еъла гдѣ-нибудь на землю, то шрудно ее согнать безъ крайняго повреждения хлѣбу и трапѣ.

Кромѣ людей, испребляющѣ ее въ неизвѣстномъ множествѣ свиньи, утки, гуси, аисты, цапли, разные кулики, вороны, скворцы и другія птицы, преслѣдующія сихъ насѣкомыхъ отъ самаго выходу ихъ изъ яицъ до самой естественной ихъ смерти; а еще больше пропадаетъ ихъ отъ сурої, мокрой и холодной погоды, которая имъ очень пропивна. Саранча даже по утрамъ лѣтомъ, когда роса еще не обсохла на расщѣняхъ, и солнце не нагрѣло порядочно воздуху, не прогаевшись съ мѣста, но укрывающаися подъ листьями трапѣ, или сидитъ на спелыхъ ихъ, какъ то я самъ много-кратно замѣтилъ, проѣзжая въ 1805 году степь между Днѣпромъ и Дономъ. Саранча причиняющаися конечно чрезвычайно много зла, но не бываетъ и безъ пользы. Когда она все поѣсть, то пропадающаися миллионы другихъ насѣкомыхъ, питающихся расщѣнями, ко-

шорыя множествомъ своимъ также причиняють большой вредъ.

Деревья и земля опыхаютъ, и последняя очень хорошо унавоживается прупами издохшей и согнившей во множествѣ саранчи. Замѣчаютъ, что обыкновенно на слѣдующій годъ послѣ появленія саранчи въ большомъ количествѣ бывають хорошие урожаи хлѣба.

По извѣстіямъ путешесственниковъ, некоторые изъ Азіатскихъ народовъ употребляютъ разныя породы саранчи въ пищу; но Резель, который для сего нарочно иныхъ изъ нихъ варилъ, не нашелъ въ нихъ никакого вкусу (*).

(*) Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung, von A. J. Rösel. Th. II. Sammlung der Heuschrecken p. 153.

к
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и



Simia rostrata. Bl. Носачистая Обезьяна.

*

НОСАСТАЯ ОБЕЗЬЯНА.

Simia rostrata, cauda mediocri, naſo elongato roſtrato. *BLUMENB.* *Handbuch der Naturgeschichte.* p. 72.
Cercopithecus naſo, barbatus fulvorufescens, facie nigra, naſo prolongato. *FISCHER Zoognofia V. II.* p. 534.
Der langnafige Affe. *BLUMENB.* I. c.
La Guenon à long nez. *BUFF. Hist. nat. Suppl. VII.* p. 53.

~~~~~


Обезьяна сія опличається отъ всіхъ доселъ ізвѣсніыхъ обезьянъ длиннимъ своимъ носомъ, между тѣмъ какъ прочія обезьяны всѣ курносы, или съ короткимъ вздернутымъ вверхъ носомъ, отъ чого и получили общее название на Латинскомъ языку *Simia* отъ слова *simus*, курносый. Носастая обезьяна сдѣлалась ізвѣсною испытавшелями природы лѣть за приданіемъ

жать предъ симъ. Бюффонъ перво  
описалъ ее съ чучелы, хранящейся въ  
Королевскомъ Кабинетѣ Напуральной  
Исторіи въ Парижѣ. Она водится въ  
Восточной Индіи; нравы ея и образъ  
жизни еще мало извѣстны.

Ростомъ она около двухъ аршинъ,  
рожа у ней голая, смуглая съ красно-  
юю, а прочее шѣло покрыто шерстью  
больше или меньше длинною. Голова у  
ней круглая, верхушка ея и затылокъ  
покрыты короткою, но густою  
шемно-каштановаго цвѣту шерстью.  
Уши голыя, шемнаго цвѣту, изъ шер-  
сти едва видныя, кругловатыя. Лобъ  
не великъ; глаза довольно большие, съ  
желтоватымъ зрачкомъ. Ротъ бол-  
шой, съ длинными клыками. Носъ по-  
хожъ нѣсколько на человѣчій, но оп-  
личается отъ онаго большею своею  
длиною; конецъ его широкъ и имѣющъ  
бороздку, раздѣляющую его какъ бы на  
две части. Ноздри широкія и имѣ-  
ющіе горизонтальное положеніе какъ  
у человѣка, выключая то, что онъ  
отъ губъ лежатъ очень далеко, ибо

находящаяся на самомъ концѣ носа.  
 Шерсть на спинѣ и бокахъ каштаново-  
 ваго цвета, а на брюхѣ, на ногахъ  
 и на рукахъ изсѣра-рыжеватаго.  
 Шерсть на подбородкѣ, около шеи и  
 на плечахъ гораздо длиннѣе, нежели на  
 прочемъ шѣль. Хвостъ довольно длин-  
 ной, однакожъ короче шѣла и весь по-  
 крытъ коропкою, гусеппою, рыжею  
 шерстью. Ладони и подошвы голыя,  
 большой палецъ на рукахъ плоской, а  
 прочие всѣ почки круглые, острыве,  
 цветомъ черные.

---



~~~~~

ПРОДОЛЖЕНИЕ СПИСКА ОСОБЬИ МЪСТЬ
ПОДПИСАВШИХСЯ НА СIE ИЗДАНИЕ СЪ
РАСКРАШЕННЫМИ КАРТИНКАМИ.

Въ Астрахани. Типулярный Совѣп-
никъ Юноша.

Въ Ярославлѣ. Ярославская Губерн-
ская Гимназія.

Въ Бобруйскѣ. Коллежскій Ассесоръ...
Сестропецевичъ.

Въ Юрьевѣ. Александръ Дмишріевичъ
Лялинъ.

Въ Тамбовѣ. Тамбовская Газетная
Экспедиція на 4 экз.

Въ Пензѣ. Прапорщикъ Гори-
хвостовъ.

Въ Козельскѣ. Типулярный Совѣп-
никъ Королевъ.

Въ Москвѣ. Аршиллериі Маіоръ и Ка-
валеръ Иванъ Ивановичъ Барышниковъ
на 4 экз.

— Типулярная Совѣпница Наспасья
Ивановна Тургенева.

— Типулярный Совѣпникъ Емелі-
анъ Савичъ Барсовъ.

— Типулярный Совѣпникъ Алекс-
ѣй Логиновичъ Шапошниковъ.

— Его Сиятельство Князь Андрей
Андреевичъ Голицынъ.

Въ Чембарѣ. Юрій Петровичъ Леръ
анповъ.

Въ Спасскѣ. Поручикъ Колешинъ

Въ Клятѣ. Коллежскій Ассесоръ ...
Голяховскій.

Въ Москвѣ. Его Сиятельство Графъ
Николай Петровичъ Толстой.

Въ Дорогобужѣ. Надворный Совѣтъ
никъ Михайла Антоновичъ Хлюспинъ.

Въ Керенскѣ. Коллежскій Ассесоръ ...
Беклешевъ.

Въ Москвѣ. Университетская книж-
ная лавка на 10 экз.

Во Мценскѣ. Генералъ-Маиръ
Кириловъ.

Въ Москвѣ. Его Сиятельство Графъ
Кирилль Ивановичъ Гудовичъ.



СПИСОКЪ ОСОБЪ ИМѢСТЬ ПОДПИСАВ-
ШИХСЯ НА СIE ИЗДАНИЕ СЪ КАРТИН-
КАМИ НЕРАСКРАШЕННЫМИ.

Въ Москвѣ. Федоръ Семеновичъ Мо-
соловъ.

— Маю́ръ и Кавалеръ Сергей Нико-
лаевичъ Глинка на 5 экз.

— Студентъ Московскаго Универси-
тета Юферовъ.

— Студентъ Московскаго Универси-
тета Макаровъ.

Въ Перми. Кушенскаго завода Медикъ
Иванъ . . . Тихоновскій.

Въ Торжкѣ. Уѣздное училище.

Въ Бѣлгородѣ. Ропмистръ
Борщовъ.

Въ Торжкѣ. Полковникъ Спа-
лыгинъ.

Въ Тамбовѣ. Газетная Экспедиція.

Въ Юрьевѣ. Купецъ Егоръ Ма-
слениковъ.

Въ Москвѣ. Университетская книж-
ная лавка на 7 экз.