



Экологическое движение Кыргызстана АЛЕЙНЕ

Э.Дж.Шукуров, Э.Э.Шукуров, Жусупбаева А.А.

**ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ПТИЦ
ВНУТРЕННЕГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЯНЬ-ШАНЯ**

Под редакцией проф. Э.Дж.Шукурова

Бишкек, 2007

Э.Дж. Шукуров, Э.Э. Шукуров, А.А. Жусупбаева
ПОЛЕВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫХ ВИДОВ ПТИЦ
ВНУТРЕННЕГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

Содержание

Полевой определитель индикаторных видов птиц	1
Птицы размером с гуся	1
Птицы размером с утку (или курицу)	3
Птицы размером с ворону	8
Птицы размером с голубя	12
Птицы размером с воробья (и меньше)	15
Основные использованные источники	27
Таблицы. Птицы-индикаторы состояния экосистем. Карта экосистем Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня	28

Для удобства определения в полевых условиях птицы сгруппированы в условные группы по размерам видов, известных каждому. Эти ориентиры даются для сравнения. Определяемые виды в каждой группе могут быть крупнее или мельче, что указано в тексте.

Обозначения размера:

Размером с гуся

Размером с утку (или курицу)

Размером с ворону

Размером с голубя

Размером с воробья (и меньше)

После названия птицы под условными обозначениями даются сведения, облегчающие распознавание.

В. Величина.

ОП. Определительные признаки

Г. Голос

От. Отличительные признаки от сходных видов

Б. Местообитания, в которых обычно встречается определяемый вид.

Некоторые виды объединены в одну статью, поскольку для целей индикации не обязательно определять их до вида (например, пеночки), тем более, что они очень плохо различаются между собой в природе.

ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ГУСЯ

Крупные хищные птицы

Буркүт - Бүркүт - Golden Eagle - *Aquila chrysaetos* - (Linnaeus, 1758).
(Таблица 2)

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупный орел. Как и у других орлов, на концах широких крыльев перья расставлены. У летящей птицы хорошо видна широкая поперечная светлая полоса у основания хвоста. Общая окраска темно-бурая. У взрослых птиц верх головы и шеи рыжевато-желтый. Молодые - темно-бурые, поперек хвоста светлая охристо-беловатая полоса. *Г.* Своеобразный клекот «кьек-кьек-кьек». *Б.* Охотится на открытых пространствах..

Грифы (Таблица 2)

Черный гриф, бурый гриф - Таз кара - Black Vulture - *Aegyptus monachus* - (*Linnaeus, 1758*)

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Держится в одиночку и группами. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными на концах перьями. Общая окраска черно-бурая. Голова и шея голые, с пятнами густого бурого пуха. *Г.* Глухое шипение. *Ом.* В отличие от сипа, окраска черно-бурая. *Б.* Открытые пространства, чаще вблизи гор.

Белоголовый сип - Ак кажыр - Griffon Vulture - *Gyps fulvus* - (*Hablizl, 1783*) (Таблица 2)

Кумай, Гималайский гриф - Кумай - Himalayan Griffon - *Gyps himalayensis* - *Hume, 1869* (Таблица 2)

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупные хищные птицы. Держатся обычно группами. На падали собирается до десятка и более. Видны чаще всего парящими или неподвижно сидящими на скалах. В полете крылья очень широкие, с пальцеобразно расставленными перьями на концах. Общая окраска бледно-рыжеватая. Крылья и хвост темно-бурые. *Г.* Глухое, грубое карканье и шипение. *Ом.* В отличие от черного грифа, окраска светлая. В природе кумай и сип практически неразличимы. Кумай в целом светлее и хвост короче и обрезан прямо, а не закруглен на конце, как у сипа и у бурого грифа. *Б.* Открытые пространства гор со скалами.

Стервятник - Журтчу, тарпчы - Egyptian Vulture - *Neophron percnopterus* - (*Linnaeus, 1758*) (Таблица 2)

В. Мельче гуся. *ОН.* Крупная хищная птица. Держится в одиночку или группами. В полете крылья широкие, с расставленными на концах перьями. Характерен и сужающийся узкий хвост. Окраска взрослых птиц белая, маховые перья крыльев черные. Голова голая, желтая. Молодые птицы темно-бурые. *Г.* Звенящая трель. *Ом.* В отличие от других грифов, величина меньше, окраска взрослых птиц белая. *Б.* Скалы и открытые пространства.

Бородач, или ягнятник - Көк жору, балта жутар - Lammergeier - *Pyraeetus barbatus* - (*Linnaeus, 1758*) (Таблица 2)

В. Крупнее гуся. *ОП.* Крупная хищная птица. Во время полета видны длинные заостренные крылья и длинный клиновидный на конце хвост. У взрослых птиц окраска верха тела буровато-серая, низ тела рыжеватый. Под клювом пучок черных перьев - «борода». Молодые - темно-бурые. *Г.* Негромкий свист и своеобразный мяукающий звук. *Ом.* В отличие от

орлов и сипа, крылья длинные, острые. *Б.* Скалы и открытые пространства гор..

Улар - Улар - Himalayan Snowcock - *Tetraogallus himalayensis* - *GE Gray, 1843* (Таблица 4)

В. Несколько мельче гуся, *ОП.* Крупная птица, напоминающие по внешнему виду курицу. Держится обычно небольшими группами на скалах или около них, часто со свистом перелетают с одной скалы на другую. Полет быстрый, прямой. Общая окраска серая, с ржавыми и светлыми полосами и тонким струйчатым рисунком. *Г.* Громкий флейтовый свист «уу-уиии», короткие свисты «уль-уль-уль», негромкое кохтанье и грубое «ког-ког-кок-кок». *В.* Верхние зоны гор. Скалы и осыпи среди альпийских лугов.

ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С УТКУ (ИЛИ С КУРИЦУ)

Поганки *Podiceps* (Таблица 1)

Большая поганка, или чомга - Чоң арам өрдөк - Great Crested Grebe - *Podiceps cristatus* - (*Linnaeus, 1758*)

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Верх тела темный, буровато-серый, низ тела белый. Щеки и подбородок серые. Весной зоб ржаво-рыжий. На голове весной пышные черные и рыжие перья, образующие «воротник». Клюв острый, бурый, с темным основанием. Водоплавающая птица. Ноги отставлены далеко назад, пальцы окаймлены широкими лопастями. Хорошо ныряет, по земле передвигается ползком, летает неохотно. *Г.* Разнообразные звуки, вроде «кек-кек», «кыоик», «ккуа». *Ом.* От других поганок отличается большей величиной, весной - воротником. *Б.* Озера и затоны рек с богатой водной растительностью.

Серощекая поганка - Арам өрдөк - Red-necked Grebe - *Podiceps grisegena* - (*Boddaert, 1783*) (Таблица 2)

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Верх тела темный, буровато-серый, низ тела белый, щеки и подбородок серые. Весной зоб ржаво-рыжий, на голове лишь небольшой хохол. Клюв острый, черный, с желтым основанием. Ноги отставлены далеко назад, пальцы окаймлены широкими лопастями. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, но летает неохотно. *Г.* Негромкое «кек-кек». Весной - громкий крик, напоминающий ржание жеребенка и переходящий в ворчание. *Ом.* От чомги отличается серыми щеками и меньшими размерами. *Б.* Стоячие водоемы с обильной водной растительностью.

Красношейная поганка - Кызыл моюн арам өрдөк - Slavonian Grebe - *Podiceps auritus* - (*Linnaeus, 1758*) (Таблица 2)

В. Значительно мельче утки. *ОП.* Верх тела темно-бурый, низ белый. Весной голова черная, с хохлом и черным воротником. От клюва через глаз к затылку тянется широкая рыжая полоса, по бокам головы пучки перьев - рожки. Шея красновато-коричневая. Ноги отставлены далеко назад. Пальцы с лопастями. Водоплавающая птица. Хорошо прыгает, по земле

передвигается с трудом. *Г.* Негромкое «ек» или «кек». Весной - низкая трель. *Ом.* От черношейной поганки отличается красно-коричневой шеей. *Б.* Озера и заводи с богатой водной растительностью.

Черношейная поганка - Кара моюн арам өрдөк - Black - necked Grebe - *Podiceps nigricollis* - *CL Brehm, 1831* (Таблица 1)

В. Значительно мельче утки. *ОП.* Верх тела темно-бурый, низ белый. На голове округлый хохол и пучки рыжих перьев за глазом. Голова и шея черные. Острый клюв слегка вздернут. Ноги отставлены далеко назад. На пальцах широкие лопасти. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, по земле передвигается ползком. *Г.* Довольно разнообразные звуки вроде «пиипи» или «уин» и трель. *Ом.* От красношейной поганки отличается черной шеей и слегка вздернутым клювом. *Б.* Озера, речные протоки и заводи.

Малая поганка - Кичинекей арам өрдөк - Little Grebe - *Podiceps ruficollis* - (*Pallas, 1764*)

В. Значительно мельче утки. *ОП.* Общая окраска серовато-бурая. Низ тела грязно-белый, щеки и передняя часть шеи ржаво-рыжие. Хохла на голове нет. Ноги отставлены далеко назад. Водоплавающая птица. Хорошо ныряет, по земле передвигается с трудом. Часто летает низко над водой. При полете видны белые зеркала на крыльях. *Г.* Мелодичное «уит-уит», сливающееся в трель. *Ом.* От других поганок отличается мелкими размерами и отсутствием украшающих перьев. *Б.* Мелкие стоячие водоемы с зарослями водных растений.

Канюки (Таблица 3)

Обыкновенный канюк, или сарыч - Кадимки сары - Buzzard - *Buteo buteo* - (*Linnaeus, 1758*)

В. Несколько мельче курицы. *ОП.* Средней величины хищная птица. В полете видны широкие, слегка заостренные крылья с широкой светлой полосой и короткий округлый хвост. Окраска верха темно-бурая, снизу беловатая, с темными продольными и поперечными пестринами. Есть птицы, у которых весь низ тела бурый или с небольшими светлыми пятнами. *Г.* Громкое гнусавое «ки-кия, ки-кия». *Б.* Гнездится в лесу. Охотится на открытых пространствах.

Зимняк, или мохноногий канюк - Жүт сары - Rough - legged Buzzard - *Buteo lagopus* - (*Pontoppidan, 1763*) (Таблица 2)

В. С курицу. *ОП.* Средней величины хищная птица. Летает, тяжело взмахивая крыльями и часто паря. Иногда «трясется» на одном месте. Часто садится на вершину дерева, стога или столба. В полете кажется почти белой, с темным брюхом, темными полосами на крыльях и хвосте. Крылья широкие, хвост короткий, округлый. Окраска верха тела светлая, белесая, с темными пестринами. *Г.* Громкое «кьяу-кьяу». *Ом.* В отличие от обыкновенного канюка, величина большая, окраска светлая.

Курганник - Кызыл сары - Long - legged Buzzard - *Buteo rufinus* - (*Cretzschmar, 1827*) (Таблица 2)

В. С курицу. *ОП.* Довольно крупная хищная птица. Во время полета видны широкие длинные крылья со светлыми пятнами. Хвост сравнительно длинный. Окраска верха тела рыжевато-бурая. Низ охристый, с продольными бурыми пестринами. *Г.* Громкое «кей-кей-кей». *От.* Очень похож на мохноногого курганника. Только вблизи видны голые ноги. *Б.* Сухие пространства степного типа.

Огарь - Аңыр - Ruddy Shelduck - *Tadorna ferruginea* - (Pallas 1764) (Таблица 1)

В. Несколько крупнее утки. *ОП.* Крупная рыжая со светлой головой птица- Крылья длинные, широкие, черные с большим белым зеркальцем. Держится парами и небольшими стайками. Часто находится вне воды. По посадке напоминает скорее гуся, чем утку, так как высоко поднимается на ногах. Полет более медленный, чему других уток, напоминает гусиный. *Г.* Громкое протяжное «ааанг-оооуу-оооуу». *От.* От других уток отличается крупной величиной и рыжей окраской. *Б.* Озера в открытых пространствах.

Кряква - Кайырма - эркеги, соно - ургачысы - Mallard - *Anas platyrhynchos* - Linnaeus, 1758 (Таблица 1)

В. С утку. *ОП.* Довольно крупная утка, очень похожая на домашнюю. Окраска верха тела у самца буровато-черная, низ серый с тонкой поперечной штриховкой. Голова черно-зеленая, отграниченная от зоба узким белым ошейником. Зоб и грудь буро-коричневые. На крыле блестящее сине-фиолетовое зеркальце с черным и белым окаймлением. Самка и самец в конце лета и начале осени сверху темно-бурые с широкими темными пестринами, снизу серовато-бурые с бурыми пестринами. Голова и шея с рыжеватым оттенком. Держится в одиночку, парами и стаями на воде или у воды. *Г.* Селезни издают характерное жвякапье, самки крякают и кричат так же, как и домашние утки. *От.* От других речных уток отличается более крупными размерами, синим зеркальцем, а самец - черно-зеленой головой и коричневым зобом. *Б.* Различные водоемы с богатой растительностью.

Чирок-свистунок - Чурөк өрдөк - Teal - *Anas crecca* - Linnaeus, 1758 (Таблица 1)

В. Раза в два мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Весной, летом и зимой селезень окрашен ярко. Верх тела и бока у него пепельно-серые, с тонким поперечным рисунком; низ тела и полоса, отделяющая крыло от спины, белые; подхвостье черное. Голова ярко-коричневая, от глаза к затылку идет темно-зеленая полоса. Зеркальце на крыле блестящее, зеленое. Самка и самец осенью сверху буровато-серые, с широкими продольными пестринами, снизу грязно-белые, с темными крапинами на зобе и груди. Держится в одиночку, парами и стайками. *Г.* У самца звонкий дребезжащий свист «фрюююк-фрююк». Самка издает высокое кряканье. *От.* Осенью отличается от трескунка зеленым зеркальцем. *Б.* Разнообразные мелкие водоемы.

Чирок-трескунок - Тырсылдак чүрөк - Garganey - *Anas querquedula* - Linnaeus, 1758 (Таблица 1)

В. Раза в два мельче утки. *ОП.* Мелкая утка. Окраска самца весной сверху пепельно-серая, плечи голубоватые, голова и зоб буровато-коричневые, брюшко белое, от клюва над глазом к затылку проходит широкая белая полоса. Самка и самец осенью сверху темно-бурые с широкими томными продольными пестринами, снизу грязно-белые с темными крапинами. У самца плечи и осенью голубоватые, зеркальце серое. Держится парами, в одиночку и стайками. *Г.* Голос самца весной - трескучее «крерр-крерр», самка звонко крикает. *Ом.* От свистунка самки и осенние самцы отличаются отсутствием зеленого зеркальца. *Б.* Различные водоемы с богатой водной растительностью.

Нырки

Красноносый нырок - Кызыл тумшук ордок - Red - crested Pochard - *Netta rufina* - (Pallas, 1773) (Таблица 1)

В. С утку. *ОП.* Окраска самца яркая. Голова у него красновато-рыжая, с большим пушистым хохлом, грудь и брюшко черные, спина бурая, бока белые. Клюв красно-оранжевый, лапы розовые. Самка серовато-бурая с более светлыми щеками и брюшком, верх головы темный. Клюв черный с красной полоской сбоку. Держится стаями и парами. *Г.* У самца негромкий свист, у самки резкое «корр-корр». *Ом.* От красноголового нырка самец отличается рыжим хохлом, самка - светлыми щеками и красной полосой на клюве. *Б.* Степные и пустынные озера, заросшие тростником; на пролетах и зимовке водохранилища.

Красноголовый нырок - Кызыл баш - Pochard - *Aythya farina* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. С утку. *ОП.* Довольно крупная утка. Селезень весной окрашен в серый цвет, голова и шея у него красно-коричневые, зоб, грудь, зашеек и подхвостье черные. У самки и селезня осенью красно-коричневый цвет заменен рыжевато-бурым, зоб и грудь буроватые. Клюв серо-голубой с черным концом. Держится в одиночку, парами и стаями, обычно на воде. *Г.* Хриплое «кэрр-р-ра», весной самец издает свистящие звуки. *Ом.* От чернетей отличается красно-коричневой или рыжей головой, *Б.* Реки и озера с зарослями тростников..

Хохлатая чернетя - Чаачылуу өрдөк - Tufted Duck - *Aythya fuligula* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. Несколько мельче утки. *ОП.* Средних размеров утка. Селезень весной и летом окрашен в черные и белые цвета. Голова, спина, шея и зоб у него черные с фиолетовым отливом. На голове хохол. Брюхо и бока белые. У самки и селезня в осенней окраске черный цвет заменен серовато-бурым. Держится стаями и парами, чаще всего на воде. Хорошо ныряет. *Г.* Самец издает тихие звуки «глю-глю» или «курлюк-рлюк», самка - грубое хриплое «кэрр--кэрр».. *Б.* Озера и широкие поймы рек лесной полосы.

..Лысуха - Кашкалдак - Coot - *Fulica atra* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. Мельче утки. *ОП.* Окраска матово-черная с сероватым оттенком на брюшке, на лбу - белая кожистая бляшка. Пальцы с плоскими лопастями с боков каждой фаланги. Клюв конический, короткий, белый. Лапы с длинными пальцами, серые. Крылья и хвост короткие. Тело сжато с боков. Прекрасно плавает и пыряет, летает неохотно. *Г.* Звонкое «тъек... тъек». *Ом.* От других птиц отличается хорошо заметной белой бляшкой на лбу. *Б.* Пресные и соленые водоемы от тайги до пустынь.

ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ВОРОНУ

Чеглок - Жагалмай - Hobby - *Falco subbuteo* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 4)

В. Заметно мельче вороны. *ОП.* Мелкий сокол. Во время полета видны серповидные крылья. Окраска контрастная: верх темно-серый, голова черноватая, горло белое, низ светлый, с продольными пестринами, подхвостье и «штаны» рыжие. «Усы» широкие и хорошо заметные. Молодые окрашены бледнее. *Г.* Звонкое «кли-кли-кли» или «кик-кик-кик». *Ом.* В отличие от сапсана, размер меньше. *Б.* Лиственные и смешанные леса. Охотится на открытых пространствах.

Балобан - Ителги - Saker - *Falco cherrug* - Gray, 1834 (Таблица 4)

В. С ворону. *ОП.* Крупный сокол. Окраска верха тела от глинисто-серой до темно-бурой. Низ беловатый, с темными каплевидными пестринами. Под глазом неясные темные «усы». *Г.* Громкое «кеек-кеек-кеек». *Ом.* В отличив от сапсана, окраска более светлая, «усы» неясно выраженные. *Б.* Лес, скалы, глинистые обрывы. Охотится на открытых местах.

Луни. Circus (Таблица 3)

Болотный лунь - Саз кулаалы, ак баш кулаалы - Marsh Harrier - *Circus aeruginosus* - (Linnaeus, 1758)

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Довольно крупная хищная птица. В полете заметны широкие заостренные крылья и сравнительно длинный хвост. Летает обычно низко над землей или над тростниками. У взрослой птицы видны светло-сероватые голова, крылья и хвост. Остальное оперение темное, ржаво-бурое. У молодых верх и бока головы желтоватые, остальное оперение темно-бурое. *Г.* Громкое «пийюю-пийюю-пийюю». *Ом.* В отличие от других луней, белого цвета в оперении нет. *Б.* Луга и заросли близ воды.

Полевой лунь - Бөктөргө - Hen Harrier - *Circus cyaneus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 3)

Степной лунь - Кулаалы - Pallid Harrier - *Circus macrourus* - (SG Gmelin, 1771) (Таблица 3)

В. С ворону, но кажутся несколько крупнее благодаря длинным крыльям и хвосту. *ОП.* Средней величины хищные птицы. Крылья сравнительно широкие, длинные, заостренные на концах. Хвост узкий и довольно длинный. Летают обычно низко над землей. Самцы имеют светлую

серо-белую окраску. Концы крыльев, а у пегого луня голова, грудь и спина черные. Самки сверху бурые, снизу ржаво-охристые, хорошо заметно белое надхвостье. Молодые похожи на самок, но низ тела у них в продольных бурых пестринках. *Г.* Громкое «цирррь-цирррь». *Ом.* Хорошо отличимы самцы: у полевого луня верх тела и грудь серые, брюхо белое, концы крыльев черные; у степного луня на крыльях есть еще черная поперечная полоска; луговой лунь более темный, с коричневыми пестринками на боках. Самки и молодые практически в полевых условиях неотличимы. От болотного луня они отличаются белым надхвостьем, меньшей величиной. *Б.* Открытые пространства, луга с кустарником.

Черный коршун - Айры куйрук - Black Kite - *Milvus migrans* - *Boddaert*, 1783 (Таблица 1)

В. Несколько крупнее вороны. *ОП.* Средней величины хищная птица. Окраска темная, рыжевато-бурая, с более светлой сероватой головой. Молодые птицы бурые с охристыми пестринами. Держится в одиночку, парами и стаями. Летает обычно невысоко над лесом или лугами. Крылья широкие, длинные. Хвост имеет вырезку. *Г.* Мелодичный свист-трель «юрль-юрль-шорррьль» и частое «ки-ки-ки». *Ом.* От других хищных птиц отличается вырезкой на конце хвоста. *Б.* Леса, обычно вблизи водоемов.

Сорока - Сагызган - Magpie - *Pica pica* - (*Linnaeus*, 1758) (Таблица 6)

В. Намного мельче вороны. *ОП.* Хорошо заметная черно-белая с длинным хвостом птица. Полет тяжелый, волнистый, с частыми взмахами коротких крыльев. *Г.* Резкое стрекотание. *Ом.* Длинный ступенчатый хвост и характерная черно-белая окраска отличают сороку от других птиц. *Б.* Разреженные леса, населенные пункты и заросли кустарников.

Грач - Чаар карга - Rook - *Corvus frugilegus* - *Linnaeus*, 1758 (Таблица 6)

В. С ворону. *ОП.* Держится стаями. Окраска сине-черная. У взрослых птиц вокруг клюва голая грязно-белая кожа. *Г.* Хриплое «краа». *Ом.* В отличие от черной вороны, у взрослых птиц кожа вокруг клюва белая. У молодых этого нет, и на расстоянии отличить их от черной вороны почти невозможно. *Б.* Светлые леса и парки.

Черная ворона - Кара карга - Carrion Crow - *Corvus corone* - *Linnaeus*, 1758 (Таблица 6)

В. С ворону. *ОП.* Заметная черная птица. Держится в одиночку, парами и стаями. *Г.* Хриплое «карр-карр». *Ом.* От грача на расстоянии почти неотличима, вблизи отличается черным клювом. От молодого грача на расстоянии почти неотличима. *Б.* Лес.

Ворон - Чөл кузгуну - Brown - necked Raven - *Corvus ruficollis* - *Lesson*, 1830(1831) (Таблица 6)

В. Значительно крупнее вороны. *ОП.* Держится в одиночку, парами и, реже, небольшими группами: Крупная черная птица. В полете виден довольно длинный, клиновидный на конце хвост. *Г.* Громкое «крुक-крुक» или глухое «кро-кро». *Ом.* В отличие от вороны и грача, величина большая, форма хвоста иная. *Б.* Весьма разнообразен.

ПТИЦЫ РАЗМЕРОМ С ГОЛУБЯ

Обыкновенная пустельга - Күйкө - Kestrel - *Falco tinnunculus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 4)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкие соколы. У взрослого самца спина глинисто-рыжая, верх головы и шеи пепельно-серый, хвост серый с черной полосой на конце, низ тела охристый с редкими темными пестринами. Под глазом неясные темные «усы». Самка и молодые сверху рыжевато-коричневые с продольными на голове и поперечными на спине темными пестринами. Хвост рыжий с поперечными темными полосами, низ тела охристо-беловатый с частыми продольными пестринами. Во время полета видны длинные острые крылья и сравнительно длинный хвост. Часто «трясутся» в воздухе, трепеща крыльями. Сидят столбиком на телеграфных проводах, столбах, стогах и сухих ветвях. *Г.* Звонкое «кли-кли-кли». *Ом.* Друг от друга в полевых условиях почти неотличимы. Держа птицу в руках, видно, что у обыкновенной пустельги когти черные, а у степной - белые. *Б.* Открытые степные пространства с группами деревьев, скалами или обрывами.

Ястреб-перепелятник - Кыргый - Sparrowhawk - *Accipiter nisus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 4)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Во время полета видны короткие округлые крылья и довольно длинный хвост. Летаёт, ловко лавируя между деревьями. Поднявшись вверх, летает, быстро взмахивая крыльями и коротко планируя. Окраска как у тетеревятника, но у самца поперечный рисунок на груди рыжий, а у самки темно-коричневый. Продольной полоски на горле обычно нет. Глаза темные. Молодые похожи на самку. *Г.* Громкое «кик-кик-кик» и «кью-кью-кью». *Ом.* В отличие от тетеревятника, размер меньше. *Б.* Различные типы леса.

Бородастая куропатка - Чил - Daurian Partridge - *Perdrix dauurica* - (Pallas, 1811) (Таблица 4)

В. С голубя. *ОП.* Небольшая курочка. Держится парами и стайками. Общий тон окраски буровато-серый, с тонким струйчатым рисунком. Бока головы, горло, середина груди и зоба охристые. На брюхе большое черное пятно (иногда его не бывает). По бокам головы у основания клюва длинные перья - борода. *Г.* Негромкое «чир-гик». *Б.* Безлесные склоны гор, поросшие кустарником.

Кеклик - Кеклик - Chukar - *Alectoris chukar* - (GE Gray, 1830)

В. С ворону. *ОП.* Небольшая курочка. Держится обычно стайками или парами. Виден чаще всего перебегающим по склонам или по камням осыпи. Окраска пепельно-серая, с розовым оттенком, на горле светлое пятно, окаймленное черной, идущей к главам и лбу полосой, на боках поперечные черные, коричневые и белые полосы. Клюв, ноги и кольцо вокруг глаза красные. *Г.* Громкое «кок-когкок-когкок-кок-кок» или «ке-ке-лек». *Ом.* В отличие от других куропаток, по бокам черные полосы. *Б.* Сухие степные участки гор с осыпями и скалами, иногда с зарослями кустарников.

Чибис - Ызгыт - Lapwing - *Vanellus vanellus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. Больше голубя. *ОП.* Спина с оливково-зеленоватым блеском, брюшко белое, голова и зоб черные с металлическим отливом. Подхвостье палево-рыжее, по краю белого хвоста широкая черная полоса. На голове длинный узкий хохол. Крылья широкие и тупые. Полет с крутыми подъемами и спусками. *Г.* Назойливое «чьи-вы-чьи-вы». *Ом.* От других куликов отличается хохолком на голове, *В.* Сырые луга, травянистые болота и поля.

Травник – Кызыл бут суу чулдук – Common Redshank - *Tringa totanus* L. (Таблица 1)

В. Меньше голубя. *ОП.* Верх тела буровато-серый с черными пестринами, низ белый с пестринами, надхвостье белое. На крыле широкая белая полоса, хорошо видная в полете. Клюв относительно короткий, у основания красный. Ноги длинные, красные. Кормится на мелководье. *Г.* Быстрое «тюли-тго-лн» и посвист «телиее», при тревоге - частое «тют-тют-тют». *Ом.* От всех улитов отличается белой полосой на крыле. *Б.* Травянистые болота и сырые луга от высокогорий до предгорных равнин.

Озерная чайка - Ак чардак - Black - headed Gull - *Larus ridibundus* - Linnaeus, 1766 (Таблица 1)

В. С ворону. *ОП.* Средней величины чайка. Общая окраска белая. Спина сизо-серая, крайние перья крыла черные, причем на первых трех большие белые пятна. Голова бурая. У молодых птиц голова белая с темными пятнами по бокам, на конце хвоста поперечная темная полоса. Клюв и ноги у взрослых птиц красные, у молодых буроватые. Держится обычно группами, летая над рекой или озером, иногда кормится на вспаханных полях. *Г.* Громкие крики «киаа-киаа», «кья-кья» и короткое «кек-кек». *Ом.* В отличие от сизой чайки голова бурая. *Б.* Озера и реки.

Речная крачка - Чагала - Common Tern - *Sterna hirundo hirundo* - Linnaeus, 175) (Таблица 1)

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Похожа на маленькую чайку. Крылья длинные, острые, хвост на конце глубоко вырезан. Обычно видна у воды. Окраска сверху светло-серая, снизу белая. На голове черная шапочка, заходящая на шею. Клюв красный, с черным концом, ноги красные. Осенью лоб белый, клюв черноватый, ноги бурые. *Г.* Громкое звонкое «криа-криа» и

«кик-кик». *Ом.* В отличие от других чаек, размер меньше. *Б.* Озера и реки обычно с песчаными берегами.

Скалистый голубь - Ак куйрук көгүчкүн - Blue Hill Pigeon - *Columba rupestris* - Pallas, 1811 (Таблица 5)

В. С сизого голубя. *ОП.* Средней величины голубь. Держится стаями. Окраска сизая, более темная на голове и шее, где отликает зеленым и красным блеском. Надхвостье и широкая полоса поперек основания хвоста белые. Полосы на крыльях и широкая полоса на конце хвоста черные. *Г.* Негромкое воркование. *Ом.* В отличие от сизого голубя, на хвосте белая полоса. *Б.* Скалы и каменные постройки

Клинтух - Кептер - Stock Dove - *Columba oenas* - Linnaeus, 1758 (Таблица 5)

В. С сизого голубя. *ОП.* Держится парами, осенью — стаями в лесу и на полях. Окраска светлая, голубовато-серая. Полоса на конце хвоста и пятна на плечах черные. *Г.* Глухое «ху-хууу». *Ом.* В отличие от сизого голубя, надхвостье серое. *Б.* Высокоствольный лес.

Вяхирь - Алагуу - Woodpigeon - *Columba palumbus* - Linnaeus, 1758 (Таблица 5)

В. Значительно крупнее домашнего голубя. *ОП.* Крупный голубь. Держится парами, осенью - стаями на полях. Общая окраска голубовато-серая. Грудь и брюхо винно-розовые. Полосы на крыльях, но краям хвоста и полукольцо на шее белые. На конце хвоста широкая поперечная черная полоса. *Г.* Глухое «куу-кру-кухууу». *Ом.* В отличие от других голубей, размеры крупные. *Б.* Высокоствольный лес.

Горлицы (Таблица 5)

Обыкновенная горлица - Бактек - Turtle Dove - *Streptopelia turtur* - (Linnaeus, 1758)

Большая горлица - Чыгыш бактеги - Rufous Turtle Dove - *Streptopelia orientalis* - (Latham, 1790)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Мелкие голуби. Держатся парами, в конце лета и осенью - стаями. Кормятся на земле. Спина рыжевато-коричневая, с широкими бурыми пестринами. Хвост и крылья сизо-черные, полосы по краям хвоста и брюхо белые. Оперение груди серовато-розовое. По бокам шеи пятна из чередующихся белых и черных перьев. *Г.* Звонкое «курр-куукуррр» у обыкновенной и глухое «уху-куу-куууу» у большой. *Ом.* Друг от друга в полевых условиях практически неотличимы; большая горлица несколько крупнее. *Б.* Светлые леса,

Кукушка - Күкүк - Cuckoo - *Cuculus canorus* - Linnaeus, 1758 (Таблица 5)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Обнаруживаются обычно по голосу. Крылья и хвост довольно длинные. Во время кукования крылья опущены вниз, хвост поднят кверху. Голова, спина и верх зоба пепельно-серые. Хвост и крылья бурые, с поперечными светлыми полосами. Грудь и брюхо белые, с

поперечными черными полосами. Встречаются птицы (чаще всего самки), у которых вместо серого цвета рыжий. *Г.* Громкое «ку-ку» и «кли-кли». *Ом.* В полете похожа на ястреба, но отличается острыми, довольно длинными крыльями. *Б.* Различные типы леса.

Сизоворонка - Көк карга - Roller - *Coracias garrulus* - *Linnaeus*, 1758 (Таблица 5)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Яркая, зеленовато-голубая птица с глинисто-коричневой спиной. Обычно видна сидящей на телеграфных проводах или сухих ветках деревьев. *Г.* Громкое «крааа-крааа». *Ом.* Окраска настолько своеобразна, что спутать с другой птицей нельзя. *Б.* Открытые степные пространства с отдельными группами деревьев, обрывы.

Удод - Үпүп - Ноорое - *Upupa epops* - *Linnaeus*, 1758 (Таблица 5)

В. Несколько мельче голубя. *ОП.* Небольшая птица с большим веерообразным хохлом. Во время полета крылья кажутся очень широкими. Полет тихий, порхающий. Клюв тонкий, длинный, слегка изогнутый вниз. Общая окраска розовато-рыжая. Брюшко белое. Крылья и хвост широкие, черные с белыми пятнами. *Г.* Глухое «уп-уп-уп». *Б.* Открытые пространства с отдельными группами деревьев.

Кедровка - Карагай карга, чаар карга - Nutcracker - *Nucifraga caryocatactes* - (*Linnaeus*, 1758) (Таблица 6)

В. Мельче голубя. *ОН.* В гнездовое время скрытная и малозаметная птица, в остальное время очень шумлива и хорошо заметна. Держится парами и стаями. Окраска темная^ каштаново-бурая,, с частыми белыми пятнышками. Шапочка на голове, крылья и хвост черные. На конце хвоста поперечная белая полоска. *Г.* Хриплое протяжное «рээаж-рэээж» или «крэй-крэй». *Ом.* Своеобразная окраска не позволяет спутать кедровку с другими птицами. *Б.* Хвойная тайга.

Галки (Таблица 6)

Клушица - Кызыл тумшук чөкөтаан - Chough - *Pyrrhonorax pyrrhonorax* - (*Linnaeus*, 1758)

В. Мельче голубя. *ОН.* Держится стаями. Крылья довольно длинные, а хвост сравнительно короткий. Вся птица черная. Клюв и ноги красные. *Г.* Звонкое «кли-аа-клиаа». *Ом.* В отличие от альпийской галки, клюв красный. *Б.* Открытые пространства гор со скалами.

Альпийская галка - Сары тумшук чөкөтаан - Alpine Chough - *Pyrrhonorax graculus* - (*Linnaeus*, 1758) (Таблица 6)

В. Мельче голубя. *ОП.* Держится обычно большими стаями. Во время полета заметны довольно длинные крылья и хвост. Общая окраска матово-черная. Клюв желтый, ноги красные. *Г.* Негромкое «кири-кири» и звонкое «криаа». *Ом.* В отличие от клушицы, клюв желтый. *Б.* Открытые пространства верхнего пояса гор со скалами.

ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ СО СКВОРЦА

Кулики

Перевозчик - Бугукуш чулдук - Common Sandpiper - *Actitis hypoleucos* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик. Держится по берегам рек. Летает обычно низко над водой. Во время полета видны белые полосы по краю крыльев и по бокам хвоста. Сидя, покачивает вверх и вниз задней частью тела. Окраска верха буровато-серая. Нижняя сторона тела белая, с размытыми темными пестринами по бокам груди и зоба. *Г.* Звонкий свист «тиви-тили-тили-титит». *Ом.* В отличие от черныша, спина и надхвостье серые. *Б.* Берега рек.

Малый зуек - Ала моюн чулдук - Little Ringed Plover - *Charadrius dubius* - Scopoli, 1786 (Таблица 1)

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Маленький куличок с довольно короткими ногами и клювом. Быстро бегают по земле, приседая и кланяясь. Окраска пестрая, надклювье целиком черное, вокруг глаза желтое кольцо, черная полоска на лбу сверху ограничена белой, ноги мясного цвета. *Г.* Печальный свист «тюююй». *Ом.* В отличие от других мелких куликов, верх тела однотонный, глинистый, на зобе черная повязка. *Б.* Сухие песчаные и галечниковые отмели по берегам рек и озер.

Бекас - Эчки маарак - Snipe - *Gallinago gallinago* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 1)

В. Со скворца. *ОП.* Небольшой кулик с короткими ногами и очень длинным клювом. Держится скрытно на земле. Вылетает обычно из-под ног с характерным крякающим звуком. Полет очень быстрый, разнообразный. Весной хорошо заметен во время тока, летает высоко, резко бросаясь вниз со своеобразным блеющим звуком. Окраска верха тела рыжеватобурая, с продольными широкими темно-бурыми и светлыми, желтоватыми полосами. Хвост и надхвостье рыжие. Низ тела белый. На шее и на зобе частые мелкие бурые пестрины. Глаза большие, сдвинутые к затылку. *Г.* В момент взлета резкое «чжэч». Весной в воздухе во время тока - «блеяние» (происходящее от прохождения воздуха между распушенными перьями хвоста), на земле - своеобразные звуки «чэ-кэ-чэ-кэ-чэ-кэ». *Б.* Болота и мочажины с топким дном, болотистые берега рек и озер.

Золотистая щурка - *Merops apiaster* Pall. (Таблица 5)

В. Со скворца. *ОП.* Держится стайками. Окраска очень яркая. Весной и летом спина и верх головы каштаново-коричневый с яркими желтыми полосами. Горло желтое, окаймленное черной полосой. Низ тела голубой. Крылья и хвост зеленые. Молодые птицы и взрослые осенью сверху зеленые. В полете видны длинные острые крылья и длинный с удлинненными средними перьями хвост. Полет очень разнообразный. Часто сидит на телеграфных проводах и сухих ветках. Клюв длинный, изогнутый вниз. *Г.* Звонкое «кюрю-кюрю». *Ом.* От зеленой щурки отличается голубой окраской

нижней стороны тела и желтым горлом. *Б.* Сухие степные пространства с глинистыми и песчаными обрывами,

Иволга - Сары барпы, саргалдак - Golden Oriole - *Oriolus oriolus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6)

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Скрытная птица. Держится в густой листве. Легко обнаруживается по голосу. Самец ярко-желтый, с черными крыльями и хвостом. На хвосте по бокам большие желтые пятна. Самка и молодые сверху серовато-зелено - желтые, снизу желтовато-белые, с редкими продольными бурыми пестринами. *Г.* Резкое «вжжжяя» и красивый флейтовый свист «фю-тиу-лиу». *Б.* Светлые лиственные леса, парки и сады

Розовый скворец - Кызгылт чыйырчык - Rose - coloured Starling - *Pastor roseus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6)

В. Со скворца. *ОН.* Шумливая заметная птица. Окраска яркая. Голова, крылья и хвост черные с металлическим блеском, остальное оперение нежно-розовое. Молодые птицы серовато-бурые. Держится обычно большими плотными стаями, реже парами и в одиночку. *Г.* Резкие, скрипучие, хриплые звуки. *Ом.* От скворца отличается розово-черной окраской. Молодые птицы несколько светлее. *Б.* Открытые сухие пространства с обрывами, осыпи и отдельные скалы в нижней части гор.

Оляпки – *Cinclus* (Таблица 7)

Обыкновенная оляпка - Ак боор суучу кара - White - throated Dipper - *Cinclus cinclus* - (Linnaeus, 1758)

Буряя оляпка - Палластын суучу кара - Brown Dipper - *Cinclus pallasi* - Temminck, 1820

В. Со скворца. *ОП.* Небольшие, плотного телосложения короткохвостые птицы. Держатся всегда у воды. Буряя оляпка однотонного бурого цвета. У обыкновенной оляпки верх тела серовато-бурый. Низ тела белый. Молодые птицы снизу беловатые с темными пестринами. Держатся у воды. Летают тяжело низко над водой. Часто ныряют, бегают по дну, плавают, помогая себе короткими крыльшками. Сидя на мокрых камнях, подергивают приподнятым вверх коротким хвостом и приседают. *Г.* Резкое «дзит-дзит». Песня - звонкая трель. *Ом.* Настолько своеобразные птицы, что спутать с другими нельзя. *Б.* Быстрые, бурные, прозрачные речки.

Арчовый дубонос - Арча балта тумшук - White - winged Grosbeak - *Mycerobas carnipes* - (Hodgson, 1836) (Таблица 7)

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Небольшая, плотного сложения птица, с очень толстым черным клювом. Держится обычно на деревьях и кустах арчи или под ними. У самца голова, грудь, хвост и крылья матово-черные, надхвостье и брюшко зеленовато-желтые, на крыле небольшое белое пятно. У самок и молодых вместо черного цвета серый. *Г.* Громкий каркающий

и скрипящий крик. *От.* В отличие от обыкновенного дубоноса, окраска черно-желтая. *Б.* Заросли древесной и кустарниковой арчи в горах.

Дрозды (Таблица 6)

Синяя птица - Сай сагызган - Blue Whistling Thrush - *Myophonus caeruleus* - (*Scopoli, 1786*)

В. Несколько мельче галки. *ОП.* Держится в одиночку и парами у воды. Часто поднимает и медленно опускает распущенный хвост, поводя им из стороны в сторону. Издали кажется черной. Окраска темная лилово-синяя. Крылья и хвост темно-синие. На груди и зобе серебристо-сероватые пятна. *Г.* Громкое резкое «дзжжжи». Песня - набор громких красивых свистов. *От.* В отличие от черного дрозда, размер крупный. *Б.* Ущелья и теснины со скалами и водопадами.

Дрозд-деряба - Чаар таркылдак - Wistle Thrush - *Turdus viscivorus* - *Linnaeus, 1758*

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Крупный дрозд. Держится в одиночку и стаями. Окраска верха тела оливково-серая. Нижняя сторона тола белая, с крупными каплевидными черными пестринами. *Г.* Громкий треск «трррр». Песня - набор красивых флейтовых свистов. *Б.* Различные типы леса.

Черный дрозд - Кара таркылдак - Blackbird - *Turdus merula* - *Linnaeus, 1758*

В. Несколько крупнее скворца. *ОП.* Довольно крупный дрозд. Окраска взрослого самца сплошь черная. Клюв и голое кольцо вокруг глаза оранжево-желтые. Самка и молодые серовато-бурые, с рыжеватым налетом, горло беловатое. *Г.* Громкое «чок-чок» или «терре-чок-чок». Песня - красивые печальные флейтовые свисты. *От.* В отличие от других дроздов, окраска черная. *Б.* Различные типы леса и кустарники.

ПТИЦЫ ВЕЛИЧИНОЙ С ВОРОБЬЯ

Ласточки (Таблица 5)

Ласточка-береговушка - Боз чабалекей - Sand Martin - *Riparia riparia* - (*Linnaeus, 1758*)

В. С воробья. *ОП.* Небольшая ласточка. Держится стаями, гнездится колониями, обычно неподалеку от воды. Хвост с неглубокой вырезкой посередине. Верх тела серовато-бурый. Нижняя сторона белая, на зобе бурый «ошейник». *Г.* Негромкое «чирр-чирр» или «дирр-дирр». *От.* В отличие от других ласточек, на зобе бурый «ошейник». *Б.* Обрывы по берегам рек и озер.

Скальная ласточка - Тоо чабалекей - Crag Martin - *Ptyonoprogne rupestris* - (*Scopoli, 1769*) (Таблица 5)

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, с темным брюшком ласточка. Держится парами и стайками. Полет довольно медленный. Крылья довольно длинные, острые, хвост с неглубокой вырезкой на конце. Общая окраска дымчато-бурая, несколько более светлая на нижней стороне тела. *Г.* Негромкое

щебетание. *От.* В отличие от других ласточек, низ тела дымчатый. *Б.* Скалистые ущелья.

Городская ласточка, или воронок - Ак куйрук чабалекей - House Martin - *Delichon urbica* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 5)

В, С воробья. *ОП.* Окраска верха тела сине-черная. Надхвостье и низ тела белые. Держится стаями. *Г.* Громкое «тиррч-тиррчт». *От.* От других ласточек отличается белым надхвостьем. *Б.* Скалы и каменные постройки.

Жаворонки (Таблица 5)

Рогатый жаворонок - Кара каш торгой - Shore Lark - *Eremophila alpestris* - (Linnaeus, 1758)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. По земле бегаёт. Полет довольно медленный, во время полета птицы все время перекликаются. Окраска верхней стороны тела розовато-серая. Лоб, полоса через глаз к уху и поперек зоба черные. Горло желтоватое или белое. По бокам головы торчащие тонкие черные перья - «рога». Весь низ тела белый. *Г.* Тихий приятный свист «фьи-фи-тити». Песня - набор щебетаний с включением тихих свистов. *От.* В отличие от других жаворонков, на голове «рога». *Б.* Открытые пространства, горная тундра, альпийские и субальпийские луга.

Полевой жаворонок - Торгой - Skylark - *Alauda arvensis* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 5)

В. Крупнее воробья. *ОП.* Держится на земле в одиночку, парами и стайками. Полет медленный, трепещущий. Поет чаще всего в воздухе, трепеща крыльями и как бы стоя на месте. Крылья широкие, длинные. Хвост относительно короткий. Верхняя сторона тела глинисто-серая с темными крупными пестринами. Нижняя сторона белая, грудь глинистая с мелкими продольными пестринами. По краям хвоста светлые полосы. *Г.* Довольно тихое «чри-ик» или «чрр-ик». Песня - звонкие, далеко слышимые трели. *От.* От хохлатого жаворонка отличается отсутствием длинного хохла на голове. *Б.* Открытые пространства и посевы.

Коньки - Anthus (Таблица 5)

Полевой конек - Эл санар - Tawny Pipit - *Anthus campestris* - (Linnaeus, 1758)

Лесной конек - Токой эрсынары - Tree Pipit - *Anthus trivialis* - (Linnaeus, 1758)

Горный конек - Тоо эрсынары - Water Pipit - *Anthus spinoletta* - (Linnaeus, 1758)

В. С воробья. *ОП.* В полевых условиях все коньки различаются с трудом. Вылетают они обычно на близком расстоянии, а пересевшую птичку увидеть трудно. Хотя по окраске почти все коньки довольно легко отличаются друг от друга, но в полевых условиях они все кажутся буроватыми сверху и светлыми снизу. На хвосте по краям белые полосы.

У полевого, степного и горного коньков нижняя сторона тела охристая, без пестрин или с очень редкими пестринами. У лугового, лесного коньков зоб и грудь испещрены продольными темными полосками. Держатся на земле парами и стайками. Во время пения самцы коньков часто взлетают в воздух и с песней же садятся обратно, описав в воздухе кругую дугу. *Г.* Отрывистое «тви» или «цир-луй». *Ом.* В отличие от трясогузок общая окраска буроватая, хвост более короткий. *Б.* Открытые пространства и опушки лесов.

Трясогузки (Таблица 5)

Желтая трясогузка - Сары жылкычы кучкач - Sykes Wagtail - *Motacilla flava* - Linnaeus, 1758

В. Мельче воробья. *ОП.* Окраска нижней стороны тела желтая, верх головы серый, спина зеленоватая. Крылья и хвост буровато-черные, по краям хвоста белые полоски. Самки окрашены бледнее. Молодые бурьга с черноватыми пятнами и полосками. Держится парами и стайками па земле. Часто садится па травинки, кусты и деревья, постоянно покачивает хвостиком. *Г.* Звонкое «псью-льи». *Ом.* От горной трясогузки отличается более коротким хвостом, от желтоголовой - серой головой. Молодые птицы желтой и желтоголовой трясогузок в полевых условиях неотличимы. *Б.* Сырые луга и еырые тундры.

Желтоголовая трясогузка - Сары баши жылкычы кучкач - Citrine Wagtail - *Motacilla citreola* - Pallas, 1776 (Таблица 5)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* У самца окраска головы и низа тела желтая, спина и крылья серые, хвост черный с белыми полосками по краям. Самка окрашена гораздо бледнее. Молодые бурые с темными полосками и пятнами. Держится на земле, бегая по ней и постоянно покачивая хвостом. Часто садится на травинки и кусты. *Г.* Звонкое «ци-ти». *Ом.* От взрослых желтых трясогузок отличается желтой головой. Молодые птицы этих видов в полевых условиях неразличимы. *Б.* Сырые луга и болотца.

Горная трясогузка - Сары жылкычы кучкач - Grey Wagtail - *Motacilla cinerea* - Tunstall, 1771 (Таблица 5)

В. С воробья. *ОН.* Небольшая птичка с очень длинным хвостом, которым она псе время покачивает. Держится по берегам рек и ручьев, иногда садится на деревья и провода. Окраска верхней стороны тела серая, надхвостье желтое. Нижняя сторона тела желтая, брюшко и горло беловатые. У самца весной горло черное. Хвост черный, с белыми полосами по бокам. *Г.* Громкое «ци-цитт». *Ом.* В отличие от желтой трясогузки, хвост очень длинный, надхвостье желтое. *Б.* Берега горных рек и ручьев.

Маскированная трясогузка - Жылкычы кучкач, жылкычы чымчык – Masked Wagtail- *Motacilla personata* - Gould, 1861

В. С воробья. *ОП.* Спина серая. Шапочка на голове, горло,, зоб, крылья и хвост черные. Низ тела, бока головы, полоски на крыльях и по бокам хвоста белые. Спина и грудь черные. Осенние птицы имеют только черное пятно на

зобе. Молодые птицы серые. Держится на земле, передвигаясь по ней мелкими шагами. Часто садится на крыши домов и деревья. Все время покачивает длинным хвостом. *Г.* Громкое «цити-цюри» и короткое «терличь». *Ом.* В отличие от белой трясогузки бока шеи и зоб черные. *Б.* Поймы и берега рек, каналов, поселения человека.

Сорокопуть (Таблица 6)

Туркестанский жулан - Кызыл борбаш - Turkestan Shrike - *Lanius phoenicuroides* - *Schalow, 1875-*

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Самец европейских жуланов имеет яркую пеструю окраску. Верх головы у него пепельно-серый, спина каштановая, хвост, крылья и широкая полоса от клюва через глаз к уху черные. По бокам хвоста белые полосы. Нижняя сторона белая с розоватым оттенком. Самка и молодые сверху рыжевато-коричневые, снизу сероватые с тонким поперечным рисунком. У самцов азиатских жуланов верх головы, спина, крылья ж хвост глинисто-коричневые различных оттенков, полоса через глаз бурая, нижняя сторона охристо-беловатая. Самки и молодые более бледной окраски. Чаще всего виден неподвижно сидящим на выдающейся ветке куста, дерева или на телеграфном проводе. *Г.* Резкое «чак-чек» и громкое «чжаа-чжаа». Песня - подражание голосам других птиц. *Ом.* От индийского жулана и красного-лового сорокопуга отличается отсутствием белых полос на крыльях. *Б.* Заросли колючих кустарников среди открытых пространств.

Чернолобый сорокопуг - Карала борбаш - Lesser Grey Shrike - *Lanius minor* - *Gmelin, 1788* (Таблица 6)

В. Несколько мельче скворца. *ОП.* Верх тела серый. Лоб, полоса через глаз, крылья и хвост черные. По краям хвоста белые полосы. Низ тела белый с розоватым оттенком. Обычно виден сидящим на сухой ветке или телеграфном проводе. *Г.* Резкое «чок-чок» или «чжужк-чок». *Ом.* От серого сорокопуга отличается черным лбом и меньшей величиной. *Б.* Отдельные группы кустов и деревьев среди степи. *XII.* Перелетная птица. *Гн.* Гнездо на кустах или деревьях. В кладке 5—6 бледно-зеленоватых с буроватыми или фиолетово-бурыми пятнами яиц.

Крапивник - Короолу - Wren - *Troglodytes troglodytes* - (*Linnaeus, 1758*) (Таблица 6)

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Маленькая юркая птичка с вздернутым кверху коротким хвостиком, шныряющая в кучах хвороста и под кустами. Окраска верхней стороны тела каштановая. Нижняя сторона охристо-серая, с поперечным тонким темным рисунком. *Г.* Звонкое «черр-черр». Песня состоит из громких трелей. *Б.* Различные типы леса с оврагами и буреломом.

Завирушки (Таблица 6)

Альпийская завирушка - Альпа көк шалкысы - Alpine Accentor - *Prunella collaris* - (Scopoli, 1769)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Малоподвижная птица. Держится на земле, камнях и скалах. Голова, зоб и верхняя часть тела буровато-серые. Горло белое, с черными пятнышками. Крылья и хвост черно-бурые, по бокам хвоста белые пятна. Бока тела ржаво-рыжие или с ржаво-рыжими полосами. *Г.* Негромкое «чирк-чирк». Песня - звонкие трели. *Ом.* В отличие от гималайской завирушки, величина несколько большая, на горле нет чисто-белого пятна. *Б.* Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников.

Гималайская завирушка - Гималай көк шалкысы - Himalayan Accentor - *Prunella himalayana* - (Blyth, 1842) (Таблица 6)

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку и стайками на камнях и скалах. Голова и верх шеи буровато-серые. Крылья, хвост и спина бурые. На спине продольные темные пестрины. Горло белое, с темными пятнышками по бокам. Низ тела беловатый, с большими частыми ржаво-коричневыми продольными пестринами. *Г.* Мелодичная трель. *Ом.* В отличие от альпийской завирушки, размер несколько меньший, на горле чисто-белое пятно. *Б.* Альпийские луга, скалы и морены ледников.

Черногорлая завирушка - Кара тамак карагай свйрак - Black - throated Accentor - *Prunella atrogularis* - (Brandt, 1844) (Таблица 6)

В. С воробья. *ОП.* Скрытная птичка, держащаяся в чаще кустов. Верх тела буровато-серый, с продольными темными пестринами. Низ тела охристый, брюшко беловатое. Горло, полоса через глаз и щеки черно-бурые. Над глазом охристая бровь. *Г.* Негромкая трель. Песня - громкие трели. *Ом.* В отличие от бледной завирушки, горло черное. *В.* Горные хвойные и смешанные леса и кустарники.

Дроздовидная камышовка - Таркылдак сьмал камышчы - Great Reed Warbler - *Acrocephalus arundinaceus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6)

В. Чуть крупнее воробья. *ОП.* Окраска верхней стороны тела у большинства видов буровато-рыжеватая, нижней - охристо-белая. У многих видов над глазом светлая бровь. Хвост с конусовидным закруглением на конце. Мелкие, очень подвижные птички, прыгающие по стеблям тростника, травы и прибрежных зарослей. *Г.* Почти у всех видов резкое «чек-чек». Песня скрипучая, с подражаниями голосам других птиц. *Ом.* От славок отличается конусовидным хвостом. *Б.* Заросли тростника, ивняка, кустарники, заросли высокой травы, обычно невдалеке от воды.

Серая славка - Боз шалкы - Whitethroat - *Sylvia communis* - Latham, 1787 (Таблица 6)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Маленькая подвижная птичка, ловко прыгающая по ветвям кустов. Во время пении часто взлетает в воздух. Окраска верхней стороны тела серовато-бурая, верх головы серый, на плечах рыжеватые перья. Нижняя сторона тела белая, с розоватым оттенком. *Г.* Довольно громкое «чек-чек». Песня щебечущая, приблизительно ее можно

передать так - «тирли- витюрли-чет-чет-ти-тир-ли». *От.* В отличие от славки-мельничка, перья на плечах рыжеватые. *Б.* Кустарники среди открытых пространств.

Пеночки – *Phylloscopus* (Таблица 6)

Зеленая пеночка - Мыймыт - Greenish Warbler - *Phylloscopus trochiloides* - (Sundevall, 1837)

Пеночка - зарничка - Кидик мыймыт - Yellow - browed Warbler - *Phylloscopus inornatus* - (Blyth, 1842)

Индийская пеночка - Индостан мыймыты - Olivaceous Warbler - *Phylloscopus griseolus* - Blyth, 1847

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Мелкие подвижные птички. Держатся на деревьях и кустах, все время прыгая по веткам. Окраска верхней стороны тела зеленовато- или буровато-серая. Нижняя сторона тела желтовато- или буровато-белая. Над глазом часто имеется светлая бровь. *Г.* Почти у всех видов короткий посвист «твить». Песня у разных видов различна.. *От.* Между собой в полевых условиях практически не различаются. В отличие от славок, верх тела у большинства видов зеленоватый, величина меньшая. *Б.* Различные типы лесов и кустарников.

Черноголовый чекан - Котурепей - Stonechat - *Saxicola torquata* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 7)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* У самца горло, голова, спина, крылья и хвост черные. Полоса на плечах, надхвостье и брюшко белые. Зоб и грудь ржаво-рыжие. Самки и самцы в осеннем наряде окрашены более тускло, и черный цвет у них заменен буроватым. Молодые охристо-буроватые со светлыми пестринами. Обычно виден сидящим на стебельке травы или на верхушке куста. Подергивает хвостиком. Очень любопытен. *Г.* Звонкое «цитчек-чек». Песня - щебечущая трель. *Б.* Сухие открытые места с редкими кустами.

Каменки *Oenanthe* (Таблица 6)

Обыкновенная каменка - Кок чакчыгай - Wheatear - *Oenanthe oenanthe* - (Linnaeus, 1758)

В. С воробья. *ОП.* Небольшая стройная, с длинными ногами птичка. Окраска самца весной и летом сверху пепельно-серая. Крылья, хвост и широкая полоса через глаз к уху черные. Низ тела охристо-белый. Самка, молодые та самец осенью окрашены в однотонный глинисто-буроватый цвет с более темными крыльями и хвостом, белыми пятнами на хвосте и белым надхвостьем. Держится на земле. Испуганная, отбегает, приседая, кланяясь я покачивая хвостом. У взлетевшей птицы хорошо видно белое надхвостье и белые пятна по бокам черного хвоста. Полет порхающий. Самец с пением поднимается в воздух, трепеща на месте крыльями и распуская хвост. *Г.* Звонкое «чек-чек». Песня разнообразная, состоящая из подражания голосам других птиц и различным звукам. *От.* Самки, молодые и осенние птицы

практически неотличимы от самок других каменок и от каменки-плясуньи. *Б.* Открытые пространства.

.Каменка-плясунья - Чакчгай - *Isabelline Wheatear - Oenanthe isabellina - (Temminck, 1829)* (Таблица 6)

В. С воробья. *ОП.* Стройная, с длинными ногами птичка. Хорошо заметны белое надхвостье и пятна по бокам темного хвоста. Общая окраска глинисто-серая. Держится на земле, часто кланяясь и покачивая хвостом. *Г.* Громкое «чек-чек». *От.* В полевых условиях практически неотличима от самок других каменок. *Б.* Открытые сухие пространства.

Встречаются также: **Каменка - плешанка** - чакчгай - *Pied Wheatear - Oenanthe pleschanka - (Lepechin, 1770)*

Горихвостки *Phoenicurus* (Таблица 5)

Седоголовая горихвостка - Карала кызыл куйрук - *Blue - headed Redstart - Phoenicurus caeruleocephalus - Vigors, 1831*

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птичка. Держится на кустах и деревьях. У самца верх головы голубовато-серый, брюшко и широкие полосы на плечах белые, остальное оперение черное. У самки и молодых общая окраска буровато-серая, надхвостье рыжее, около глаза светлое, хорошо заметное кольцо. *Г.* Довольно громкий писк или свист «цсиинить-цить». *От.* В отличие от других горихвосток, хвост черный или бурый. *Б.* Горные леса с кустарниками.

Горихвостка-чернушка - Кара кызыл куйрук - *Black Redstart - Phoenicurus ochruros - (SG Gmelin, 1774)* (Таблица 5)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится на земле и на камнях. У самца верх головы и шеи (у западных птиц и брюшко) серые, спина, горло, бока головы, грудь (у западных и кавказских птиц и верхняя часть брюшка) черные, брюшко и хвост ржаво-рыжие. Самка буровато-серая, с рыжим хвостом. *Г.* Звонкое «фьюить-тик-тик». Песня - скрипящие и шипящие звуки с отдельными звонкими трелями. *От.* В отличие от обыкновенной лоб серый, грудь черная. Самки и молодые различаются с трудом. *Б.* Открытые пространства гор со скалами, осыпями и выходами камней.

Рыжеспинная горихвостка- Кызыл бел кызыл куйрук - *Eversmanns Redstart - Phoenicurus erythronotus - (Eversmann, 1841)* (Таблица 5)

В. С воробья. *ОП.* Держится в кустах. Сидя, все время потряхивает хвостом. У самца верх головы и шеи серый, лоб и широкая полоса от клюва через глаз черные, крылья бурые, полосы на плечах и брюшке белые, спина, горло, грудь и хвост красновато-рыжие. Самка буровато-серая, с рыжим хвостом. Молодые серовато-бурые со светлыми пестринами и рыжим хвостом. *Г.* Глухое «трр-трр» и звонкое «фьиить». *От.* У самцов, в отличие от других горихвосток, спина рыжая. Самки и молодые очень похожи на чернушек, но несколько крупнее. *Б.* Горные леса и кустарники на сухих склонах с осыпями и скалами.

Встречается также в сходных условиях **Обыкновенная горихвостка** - Кызыл куйрук - Redstart - *Phoenicurus phoenicurus* - (Linnaeus, 1758). У самца верх головы, шеи и спины пепельно-серый. Лоб белый. Бока головы и горло черные.

Краснобрюхая горихвостка - Кызыл ич кызыл куйрук - Guldenstadts Redstart - *Phoenicurus erythrogaster* - (Guldenstadt, 1775) (Таблица 5)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Небольшая, с довольно длинными ногами птица. Чаще всего видна сидящей на камне, на верхушке куста и по берегам речек. Сидя, все время потряхивает хвостом. Полет довольно плавный, во время него хорошо видны широкие, черные, с белой поперечной полосой крылья. У самца голова, горло, зоб, спина и крылья черные, шапочка на голове и широкая полоса на крыле белые, грудь, брюшко и хвост ржаво-красные. Самка и молодые буровато-серые, с рыжим хвостом, у молодых светлые пестрины. *Г.* Звонкое «тьиить-ти-тик». Песня - тихое щебетание. *Б.* В летнее время - верхний пояс гор, глухие ущелья, скалы и осыпи.

Соловьи (Таблица 6)

Южный соловей - Булбул - Nightingale - *Luscinia megarhynchos* - *CL Brehm, 1831*

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Стройные, с довольно длинными ногами птички. Держатся на земле и на нижних ветках деревьев и кустов. Сидя, часто поводят хвостом вверх, вниз и в стороны. Верх тела коричневатобурый, низ беловато-серый. *Г.* Низкое «фиуть-трр». Песня звучная и разнообразная. *Б.* Лиственные и смешанные леса с кустарником. Чаще держатся близ воды.

Черногрудая красношейка - Кызыл тамак - White - tailed Rubythroat - *Luscinia pectoralis* - (Gould, 1837) (Таблица 6)

В. С воробья. *ОП.* Небольшая, стройная, с довольно длинными ногами птичка. Держится на земле, камнях и нижних ветках кустов и деревьев. Часто поводит вверх и вниз черным с белым основанием хвостом. Во время пения самец поднимает хвост кверху. У самца верх тела голубовато-серый, брюшко и бровь белые, грудь и шея черные, горло блестяще-красное. У самки и молодых красного и черного цвета в окраске нет. *Г.* Негромкий свист и короткий треск. Песня состоит из громких трелей. *От.* В отличие от красношейки, у самцов грудь черная, у самок общий тон окраски голубовато-серый. *Б.* Кустарники в горных лесах и на субальпийских лугах.

Варакушка - Көк тамак - Bluethroat - *Luscinia svecica* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая, стройная птичка. Окраска сверху оливково-серая, хвост рыжий с темными полосами посередине и на конце. У самца горло и грудь ярко-синие, окаймленные снизу рыжей и темной полосками. Посередине синей груди рыжее или белое пятно, иногда пятна нет. Брюшко белое. У самки горло и грудь беловатые, с темными пестринами. Молодые сверху бурые со светлыми пятнышками,

снизу охристые с темными пятнышками. Держится на земле и на кустах. Поющий самец поднимает голову и хвост и опускает крылья. *Г.* Довольно громкое «чак-чак». Песня громкая, с подражанием голосам других птиц. *Б.* Заросли кустарников вблизи воды.

Синицы *Parus* (Таблица 6)

Джунгарская гаичка - Тоодогу кашка чымчык - *Songor tit - Parus songarus - Severtzov, 1873*

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижные ловкие птички, держатся парами и стайками на кустах и деревьях. Окраска верхней стороны тела буровато-серая, нижней — грязно-беловатая. На голове черная шапочка, доходящая почти до спины, на горле черное пятно. *Г.* Звонкое «цици-чжжж-чжжж» и печальный свист «шой-шоююй-шоюююй». *Б.* Различные типы леса.

Желтогрудая лазоревка - Сары төш кашка чымчык - *Yellow - breasted Tit - Parus flavipectus - Severtzov, 1873* (Таблица 6)

Белая лазоревка, князек - Ак кашка чымчык - *Azure Tit - Parus cyanus - Pallas, 1770*

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Небольшая подвижная белая птичка, ловко лазающая по кустам и среди ветвей деревьев. Общая окраска белая. Полоска через глаз синевато-черная, крылья и хвост голубые. Поперек крыла и по бокам хвоста широкие белые полосы. Спина серовато-голубая. У желтогрудых лазоревек верх головы и спина дымчато-голубоватые, грудь желтая. *Г.* Звонкое «ци-цинь-цирррззь». *Б.* Лиственные и смешанные леса, заросли по берегам рек.

Черная синица, или московка - Кара кашка чымчык - *Coal Tit - Parus ater - Linnaeus, 1758* (Таблица 6)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Непоседливая небольшая птичка, держащаяся обычно парами или стайками в кронах деревьев. Часто подвешивается на концы веточек. Голова черная, с белыми щеками. Спина голубовато-серая, крылья и хвост голубовато-бурые. Нижняя сторона тела грязно-белая, с охристо-буроватыми боками. *Г.* Звонкое «ци-пи, ци-пи» или «ти-ти-тй, ти-ти-тй». *Ом.* В отличие от гаички, щеки белые, хвост довольно короткий. *Б.* Хвойные и смешанные леса.

Рыжешейная синица - Кызыл моюн кашка чымчык - *Rufous-naped Tit - Parus rufonuchalis - Blyth, 1849* (Таблица 6)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Подвижная, темная, с белыми щеками птичка. Держится в одиночку и парами на деревьях или под ними. Голова и грудь черные. Щеки белые. Хвост и крылья буро-серые. Подхвостье, пятно на шее и перья под крылом ржаво-рыжие. На затылке белое пятно. Брюшко темное, голубовато-серое. *Г.* Звонкое «ци-фюююй». Песня - громкая трель. *Ом.* В отличие от черной синицы, величина несколько большая, общая окраска серая. *Б.* Горные еловые и арчовые леса.

Большая синица - Чоң кашка чымчык - *Great Tit - Parus major - Linnaeus, 1758* (Таблица 6)

В. С воробья. *ОП.* Бойкая подвижная птица. Голова, поясok вдоль середины груди, горло, задняя часть брюшка и подхвостье черные. Щеки белые. Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая (у среднеазиатских больших синиц спина голубовато-серая). Нижняя сторона тела желтая (у дальневосточных и среднеазиатских птиц - белая). *Г.* Звонкое «пинь-пинь-чэржжж». Песня - громкие свисты «ци-пи-ци-пи-ци-пи-ин-ча-ин-ча». *Ом.* В отличие от других синиц, величина большая. *Б.* Различные типы леса.

Воробьи (Таблица 7)

Каменный воробей - Сары тамак таш таранчы - Rock Sparrow - *Petronia petronia* - (Linnaeus, 1766)

В. С домового воробья. *ОП.* Держится стайками, парами и в одиночку. Полет быстрый, может планировать. Крылья в полете кажутся довольно длинными. Общая окраска буровато-серая. Над глазом светлая бровь. На зобе желтое пятно. По бокам хвоста белые пятна. *Г.* Громкое «ги-ю-иб». *Б.* Сухие склоны гор, скалы, обрывы и осыпи.

Снежный воробей - Ала дунга - Snow Sparrow - *Montifringilla nivalis* - (Linnaeus, 1766) (Таблица 7)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками и парами на камнях, скалах и на земле. В полете кажется белым. Окраска спины бурая, крылья и хвост темно-бурые, с широкими белыми полосами. На горле черное пятно. Весь низ тела белый. Молодые буровато-серые. *Г.* Гнусавое «ввууэй». *Ом.* В отличие от жемчужного вьюрка, низ тела белый. *Б.* Скалы, осыпи и постройки среди субальпийских и альпийских лугов.

Королевский, (корольковый, красношапочный) вьюрок - Кызыл бетейт мукур - Red - fronted Serin - *Serinus pusillus* - (Pallas, 1811) (Таблица 7)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится обычно стайками на земле и на кустах. У взрослых птиц лоб и темя огненно-красные. Горло, зоб, грудь и голова черные. У молодых голова коричневая, без красной шапочки. *Г.* Звонкая, мелодичная трель. Песня состоит из набора трелей и щебетания. *Б.* Субальпийские луга со скалами и осыпями и верхняя часть лесного пояса.

Седоголовый щегол - Туркестандык сары канат - Turkestan goldfinch - *Carduelis caniceps* - Vigors, 1831 (Таблица 7)

В. С воробья. *ОП.* Небольшая пестрая птица. Держится обычно стаями. Кормится на репейнике. На ночевку стаи собираются на высоких деревьях. Во время пения птица поворачивается из стороны в сторону. У взрослых птиц верх головы серый, крылья и хвост черные. Щеки, лоб, брюшко, пятна на хвосте и на кончиках крыльев белые. На крыльях поперечная желтая полоса. Вокруг клюва широкая красная полоса. Спина и пятна по бокам груди буровато-серые. Молодые буровато-серые, с темными пестринами. Крылья и хвост у них такие же, как и у взрослых птиц. *Г.* Звонкое «пить-пили-пить». Песня состоит из звонких трелей. *Ом.* У молодых, в отличие от

молодых коноплянок, на крыльях желтые полосы. *Б.* Светлые лиственные и смешанные леса, сады и парки.

Коноплянка - Кызыл төш чымчык - Linnet - *Acanthis cannabina* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 7)

В. Несколько мельче воробья. *ОП.* Держится парами и стайками на земле, на высокой траве и на кустах. Окраска спины коричневая, голова сверху серая, надхвостье розовато-серое. На крыльях и хвосте продольные широкие черные и узкие белые полосы. У самца по бокам груди большие красные пятна, на лбу малиновое пятно. У самок и молодых красного оперения нет. Низ беловатый, с продольными бурыми пестриями. У самца пестрин нет. *Г.* Щебечущие звуки «тк-тк-тк». Песня - звонкие свисты и щебетание. *Ом.* В отличие от чечетки, спина коричневая. *Б.* Опушки лесов, группы кустов, посадки вдоль дорог и сухие горные степи с кустами можжевельника.

Желтоголовый королек - Сары баш мыймыт - Goldcrest - *Regulus regulus* - (Linnaeus, 1758) (Таблица 6)

В. Значительно мельче воробья. *ОП.* Самые маленькие из наших птичек. Держатся стайками и парами в ветвях деревьев, предпочитают хвойные породы. Очень подвижны, часто трепещут на месте у конца ветки. Общая окраска зеленовато-серая, более светлая на нижней стороне тела. У красноголового королька спина с примесью оранжево-желтых тонов. На крыльях поперечные светлые полосы. На верхней стороне головы широкая оранжевая или желтая полоска, окаймленная по бокам широкими черными полосками. У красноголового королька от клюва к глазу идет черная полоска, щеки голубовато-серые, над глазом яркая белая бровь. *Г.* Тихое «ци-ци-ци». Песня очень тихая — «ци-фли-фин, ци-фли-фин». *Ом.* От пеночек отличается наличием черных полос на голове и желтой «шапочки» на темени.

Вьюрки (Таблица 7)

Гималайский вьюрок - Тоо таранчы - Plain Mountain Finch - *Leucosticte nemoricola* - (Hodgson, 1836)

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стаями. Кормится на земле. Общая окраска темная, буро-серая, на спине темные и христые пестрины. На крыле светло-буроватые поперечные полосы. Хвост на конце глубоко вырезан. *Г.* Звонкое «чууии» и негромкое чириканье. *Ом.* В отличие от самки домового воробья, окраска более темная, на хвосте глубокий вырез. *Б.* Субальпийские и альпийские луга с выходами скал и осыпями.

Жемчужный вьюрок - Брандтын тоо таранчысы - Brandts Mountain Finch - *Leucosticte brandti* - Bonaparte, 1850

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стаями на камнях, скалах и на земле. В полете кажется почти белым. Общая окраска светло-серая. Крылья и хвост бурые, на сгибе крыла мелкие розовые перышки. Лоб черный. На крыльях светлые поперечные полосы. *Г.* Громкое чириканье. *Ом.*

В отличие от снежного вьюрка, низ тела серый. *Б.* Верхний пояс гор. Альпийские луга, скалы, осыпи и морены ледников.

Обыкновенная чечевица - Эжеке бээ саа - Scarlet (Common) Rosefinch - *Carpodacus erythrinus* - (Pallas, 1770) (Таблица 7)

В. С воробья. *ОП.* Держится в одиночку и парами. У взрослого самца спина, хвост и крылья буро-красноватые, брюшко розовато-белое, голова, зоб и грудь ярко-красные. Самка и молодые сверху серовато-зеленоватые, снизу грязно-белые, с продольными буроватыми пестринами. *Г.* Негромкое «чуин». Песня - набор негромких свистов и громкое «чиу-вичиу». *От.* В отличие от других чечевиц, размер несколько меньший, у самцов ярко-красная окраска. В отличие от самки зеленушки, у самки на хвосте нет желтого цвета. *Б.* Опушки лесов, кустарники среди лугов и пойменные заросли.

Овсянки (Таблица 7)

Просянка - - Чоң чыйпылдак - Corn Bunting - *Emberiza calandra* - Linnaeus, 1758)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Часто сидит на вершинках кустов или невысоких деревьев. Окраска сверху серовато-бурая, с темными и светлыми пестринами. Низ тела грязно-белый, с темно-бурыми продольными пестринами на груди и боках. *Г.* Резкое «цик-цик». Песня - короткая трель. *От.* В отличие от других овсянок, размер более крупный. *Б.* Открытые пространства с отдельными группами кустов.

Горная овсянка - Тоо чыйпылдак - Rock Bunting - *Emberiza cia* - Linnaeus, 1758 (Таблица 7)

В. Несколько крупнее воробья. *ОП.* Держится стайками. Кормится на земле, часто в загонах для скота. Хвост довольно длинный, темно-бурый, с белыми полосками по бокам. Грудь и брюшко рыжевато-коричневые, голова и зоб серые. Над глазом светлая полоса, окаймленная сверху черным. От клюва через глаз, окаймляя щеки и кончась опять у клюва, проходит черная полоска. У самки и молодых окраска тусклая и полоски на голове почти не видны, а на груди есть продольные узкие бурые пестрины. *Г.* Негромкое «циин-цик». Песня - короткая сухая трель. *От.* В отличие от скалистой овсянки, окраска более яркая, величина большая. *Б.* Открытые пространства гор с выходами скал, осыпями и редкой растительностью.

Красноухая овсянка - Кызыл кулак чыйпылдак - Meadow Bunting - *Emberiza cioides* - Brandt, 1843 (Таблица 7)

В. С воробья. *ОП.* Держится парами и стайками. Самец поет, сидя на вершине куста, дерева или травинки. Хвост довольно длинный, с белыми полосами по бокам. У самца верх головы, щеки, полоса через глаз, узкая полоска от края клюва вниз, широкий «ошейник» на груди и спина каштаново-рыжие. Горло, полоса над глазом, шея и брюшко

белые. Самка и молодые более тусклые. Г. Негромкое «цик-цик». Б. Открытые участки с разбросанными группами кустов.

Скалистая овсянка - Татолбек - Grey - necked Bunting - *Emberiza buchanani* - Blyth, 1844 (Таблица 7)

В. С воробья. ОП. Держится в одиночку, парами и стайками. Кормится на земле. Верх головы и шея серые. Спина серовато-бурая, нижняя сторона тела светлая, рыжевато-коричневатая. Клов красноватый. Г. Негромкое «ции-цик». Б. Каменистые склоны гор с редкой растительностью.

Желчная овсянка - Сары айгыр, сары чыйпылдак - Red - headed Bunting - *Emberiza bruniceps* - Brandt, 1841 (Таблица 7)

В. С воробья. ОП. Окраска самца очень яркая. Голова у него ярко-рыжая, спина коричнево-зеленоватая, весь низ тела ярко-желтый. Самка и молодые желтовато-серые, с более светлой нижней стороной тела. Держится парами и стайками. Самец поет сидя на травинке, кустике или телеграфном проводе. Г. Негромкое «цик-цик». Песня - громкое «чуть-чуть-чуть-три-ури-ури». Б. Открытые степные пространства.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Perrins C. Birds of Britain and Europe. Texas, 1987.

Беме Р.Л., Кузнецов А.А.. Птицы лесов и гор СССР. М. 1981.

Беме Р.Л., Кузнецов А.А.. Птицы открытых и околородных пространств СССР. М. 1983.

Давлетбаков А., Шукуров Э.Дж.. Млекопитающие и птицы – индикаторы состояния экосистем Западного Тянь-Шаня. Бишкек, 2003.

Мониторинг биоразнообразия Западного Тянь-Шаня. Под ред. проф. Э.Дж.Шукурова. Бишкек, 2006, 92 с.

Флинт В.Е., Беме Р.Л., Костин Ю.В., Кузнецов А.А.. Птицы СССР. М. 1968.

Шукуров Э.Дж. Птицы Киргизии. Фрунзе: Мектеп, ч.1, 1981; ч.2, 1986

Шукуров Э.Дж. Природная основа развития страны//Кыргызстан. Окружающая среда и природные ресурсы для устойчивого развития. Бишкек, 2007.